

혈압·혈당을 낮추는 운동 처방

운동은 양보다 배치가 중요합니다. 몰아서 하는 운동보다 짧게 자주 하는 운동이 혈당이 튀는 것을 억제하고, 이완기 혈압이 높다면 버티는 운동(등척성 운동)을 더합니다.

먼저, 이 네 가지만 기억하세요

유산소 운동

30분×주5회

몰아서 하는 주말 3시간보다
낮습니다

식후 걷기

15분×3번

저녁 한 번 1시간보다 낮습니다

버티기 운동 강도(악력기)

최대 악력 30%

2분 버티고 1분 쉬기

근력운동 순서

하체부터

큰 근육을 먼저 움직입니다

나눠서, 자주 — 언제 어떻게 움직일지

몰아서 하지 말고 나눠서 · FREQUENCY

1. 주말 3시간보다 30분씩 주 5회가 낮습니다
2. 매일 몸을 움직이는 습관이 핵심입니다

식후엔 짧게, 여러 번 · TIMING

1. 저녁 한 번 1시간보다 식후 15분씩 3번이 낮습니다
2. 식사 후 바로 앉지 말고 짧게라도 걸어 보세요

이완기 혈압이 높다면 — 버티기 운동(등척성 운동)

버티기 운동 처방 · ISOMETRIC HOLD

1. 악력기 — 최대 악력의 30%로 2분 쥐고, 1분 쉬기를 2회. 사무실에서도 짧게 할 수 있습니다.
2. 벽 스쿼트·플랭크 — 악력기처럼 측정하기 어려우니, 힘들지만 계속할 수 있는 강도로 2분 버티고 1분 쉬기를 2회 하되 무리하면 시간을 줄이세요.
3. 주의 — 유산소 운동에 더하는 보조 운동이며, 혈압이 아직 조절되지 않았다면 시작 전 담당 의료진과 상의하세요.

걸음 수보다 강도, 다치지 않게

걸음 수보다 강도 · INTENSITY

1. 걸음 수만으로는 운동량을 판단하기 어렵습니다. 산책은 활동이고, 운동은 숨이 찰 정도의 강도가 필요합니다
2. 근력운동은 하체부터 시작하세요 (큰 근육군 먼저)

다치지 않게 · SAFETY

1. 다치면 운동을 아예 못 하게 됩니다 — 무게보다 횟수를 먼저 늘려 보세요
2. 관절이 아프면 쉬세요

흔한 오해 바로잡기 · MYTH

"7~8천 보 걸으니 충분하다" — 걸음 수만으로는 부족합니다. 강도와 근력운동이 함께 필요합니다.
"살이 빠져야 운동할 수 있다" — 지금 체중에서 시작해도 혈압·혈당이 좋아질 수 있습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 (2025) 운동요법

본 자료는 일반적인 운동 원칙을 안내하며, 개인별 운동 강도·종류와 동반질환에 따른 주의사항은 담당 의사와 상의해 정합니다. 운동 중 가슴 통증·심한 호흡곤란·실신감이 있으면 즉시 멈추고 응급실로 가시거나 119에 연락하세요. 가벼운 어지럼에도 즉시 운동을 멈추고 쉬시고, 반복되면 진료받으세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/exercise-bp-glucose/