

감량의 끝은 유지의 시작

체중이 내려간 뒤가 진짜 치료입니다. 정체기, 외식, 운동, 중단 계획을 미리 설계해야 요요를 줄일 수 있습니다.

가장 오래 남는 것은 루틴입니다

약의 효과가 좋아도 걷기, 근력, 단백질, 수면이 빠지면 유지가 흔들립니다.

최소 운동

식후 걷기 10분 또는 하루 총 20분.

단백질

매끼 단백질 먼저, 빠지는 끼니는 대체식보다 실제 음식 우선.

수면

수면 부족은 식욕 반동과 야식 욕구를 키웁니다.



그림 · 유지 루틴 — 운동과 단백질과 수면 루프 일러스트(설명용 그림).

Tip · 유지기는 더 많이 참는 시기가 아니라 최소 루틴을 자동화하는 시기입니다. 바쁜 주에도 지킬 수 있는 바닥선을 정하세요.

근거 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침 · 미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내(운동 분량 예시)

정체기는 실패가 아니라 몸의 적응입니다

체중이 멈추면 약 실패로 단정하기보다 기록, 식사, 활동량, 수면을 같이 봅니다.



먼저 기억할 점

체중이 2-4주 멈추는 시기는 흔합니다. 이때 무리하게 굶기보다 허리둘레, 식사 기록, 활동량을 점검합니다.

기록

간식·음주·외식 빈도가 늘었는지 확인합니다.

활동량

체중이 줄며 일상 소모량이 함께 줄 수 있습니다.

진료 상담

증량, 유지, 휴약, 다른 질환 평가는 진료에서 결정합니다.

Tip · 체중이 2-4주 멈추는 시기는 흔합니다.

근거 · 광교바른내과 진료 안내(정체기 점검)

감량 후에는 근력운동을 더 빼면 안 됩니다

체중이 줄수록 근육은 대사와 자세를 지키는 핵심 자산입니다.



그림 · 근력 유지 — 감량 후 근력 유지 운동 일러스트(설명용 그림).

살펴볼 것	실천 방법
걷기+근력	걷기 20분 뒤 의자 스쿼트와 벽 푸시업을 붙입니다.
강도	통증 없이 쉽다면 세트 수를 하나 늘립니다.
체크	체중보다 허리둘레와 계단 오르기 편안함을 봅니다.

Tip · 유지기에는 운동을 늘리기보다 끊기지 않는 주 2회가 더 중요합니다. 걷기와 근력운동을 묶어 한 루틴으로 만듭니다.

근거 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침 · 광고바른내과 진료 안내(운동 예시)

회식·명절·여행은 예외가 아니라 계획 대상입니다

완벽히 피하는 전략보다 회복이 빠른 전략이 오래갑니다.



그림 · 외식·회식 — 외식 테이블과 덜어먹기 일러스트(설명용 그림).

1 전 확인

굵고 가지 말고 단백질 간식을 작게 먹습니다.

2 중 확인

처음부터 덜어먹고, 술은 천천히 또는 줄입니다.

3 후 확인

다음 날 보상 굶기보다 걷기와 평소 식사로 복귀합니다.

Tip · 한 끼가 흐트러져도 다음 끼에서 회복하면 됩니다. 치료를 망치는 것은 한 번의 외식이 아니라 포기 모드입니다.

근거 · 미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내(외식 실천 예시)

이번 회차는 3개월 유지 계획

이번 주는 다음 3개월 동안 유지할 최소 루틴을 정합니다 · 집에서 볼 1장 요약: **시작 안내문**

이번 회차 핵심

- 01** 유지는 의지보다 최소 루틴 이 결정합니다.
- 02** 정체기는 실패가 아니라 점검 신호입니다.
- 03** 근력운동은 감량 후에도 계속 필요합니다.
- 04** 회식 후에는 보상 굶기보다 다음 루틴으로 복귀합니다.

광고바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광고바른내과 진료 안내