

대상포진, 원인부터 예방까지

잠든 수두 바이러스가 깨어나 생기는 띠 모양 통증과 물집 — 72시간 골든타임과 예방 백신

한국에서 매년 75만 명이 대상포진을 겪습니다

한국은 서양보다 2배 이상 흔하고, 특히 50세 이후 크게 늘어납니다

75만 명

한국 연간 환자 수

수두를 앓은 사람은 누구나 걸릴 수 있습니다

10.4명

1,000명당 한 해 발생

서양(1,000명당 3~5명)의 2배 이상

50세 이후

위험이 크게 늘어남

면역력이 떨어지면서 늘어납니다



왜 생기나요

어릴 때 수두를 일으킨 바이러스가 척수 옆 신경 마디(신경절)에 숨어 있다가, 면역력이 떨어지면 다시 깨어납니다.



그래서 두 가지가 중요합니다

빨리 알아채 치료하는 것, 그리고 백신으로 미리 대비하는 것입니다.

Tip · 수두를 앓은 기억이 없어도 어릴 때 가볍게 지나갔을 수 있습니다.

근거 · 국내 대상포진 역학 · 대한감염학회 2023

몸 한쪽에 띠처럼 생기는 통증과 물집

한 신경이 맡은 피부 구역(피부절)을 따라 한쪽에만 나타납니다 — 영어 이름도 '허리띠'라는 뜻

55%

가슴·등

등에서 옆구리를 거쳐 가슴·배까지

20%

목

목과 어깨·팔 쪽

15%

눈 주변

이마·눈꺼풀·코끝

11%

허리·엉치

허리 아래와 다리 쪽

등에 물집, 가슴이 아파도 정상 경과

같은 신경이 이어져 있어서입니다. 한쪽만 생기고 몸 가운데를 넘지 않는 것이 특징입니다.

물집 전 통증만 먼저 올 수 있습니다

물집이 생기기 1~5일 전 통증만 있어 협심증·담석증·맹장염으로 오해하기도 합니다.

Tip · 한쪽에만 띠 모양으로 아프고 따끔거리면 대상포진을 떠올리세요.

근거 · Cohen, NEJM 2013 · 피부절 재활성화 해부

증상의 흐름 — 전조부터 회복까지

물집이 생기고 72시간 안에 항바이러스제를 시작하는 것이 가장 중요합니다




그림 · 신경을 따라 한쪽에 생긴 물집과, 물집 → 딱지 → 회복으로 가는 단계를 그린 설명용 그림입니다.

1 전조기 1~5일 전

화끈거리고 찌르는 통증, 피로·근육통. 다른 병으로 오해하기 쉽습니다.

2 물집기 ~15일

붉은 바탕에 물집이 모여 생기고 3~5일간 새로 생긴 뒤, 7~10일에 딱지가 앉습니다.

3 회복기 2~4주

딱지가 떨어지며 회복합니다. 색소나 흉터가 남을 수 있습니다.

4 포진후신경통 90일 이상

물집이 나은 뒤에도 화끈거림, 옷만 스쳐도 아픈 통증이 남습니다. 고령에서 흔합니다.

Tip · 72시간 골든타임 — 새 물집이 계속 생기거나 고령·면역저하·노 주변이면 72시간이 지나도 약을 씁니다.

근거 · 코크란 리뷰 · 미국감염학회 2022

항바이러스제와 통증 약

72시간 안에 항바이러스제 + 통증 정도에 맞춘 단계적 진통 — 빠른 시작이 핵심

약	먹는 법	특징
발라시클로버 (1차)	1,000mg · 하루 3번 · 7일	흡수가 잘되고 먹기 편함 — 통증 기간을 51일→38일로 줄였습니다
팜시클로버	500mg · 하루 3번 · 7일	발라시클로버와 효과 비슷 · 콩팥 기능에 따라 용량 조절
아시클로버	800mg · 하루 5번 · 7일	먹는 횟수가 많지만 저렴 · 콩팥이 나쁘면 용량 조절
진통 1단계	아세트아미노펜 · 소염진통제	가벼운 통증 — 위장·콩팥에 주의해 짧게
진통 2단계	가바펜틴 · 프레가발린	신경통에 추가 — 졸림·어지러움·부종이 흔함
진통 3단계	트라마돌 · 단기 마약성 진통제	심한 급성기 통증에만 짧게 · 리도카인 5% 패치는 어르신께 유용

Tip · 진통제 용량은 통증과 몸 상태에 맞춰 진료 때 정합니다.

근거 · 발라시클로버 vs 아시클로버 무작위 시험(1,141명) · 미국감염학회 2022

포진후신경통 — 누가 더 잘 생기나

물집이 나은 뒤 90일 넘게 남는 통증 — 80세 이상 32%, 50세 미만 3%

1 나이 가장 강력

60~65세 20%, 80세 이상 32% — 백신이 가장 중요합니다.

2 처음부터 심한 통증 약 2.2배

초기 통증을 잘 조절하면 줄일 수 있습니다.

3 넓게 퍼진 물집 약 2.6배

한 구역을 넘으면 따로 평가합니다.

4 물집 전 통증이 있었음 약 2.3배

전조 통증이 있었다면 빨리 치료를 시작합니다.

5 눈 주변 침범 약 2.5배

눈 합병증도 있어 바로 안과 진료.

6 대부분 6개월 안에 좋아짐 경과

약 2%는 5년 넘게 통증이 남습니다.



그림 · 신경이 다쳐 물집이 나은 뒤에도 통증이 남는 모습을 그린 설명용 그림입니다.

Tip · 빠른 항바이러스제와 백신이 포진후신경통 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

근거 · Drolet 2010 · 미국 질병통제예방센터 2024

두 가지 백신 — 생백신과 재조합 백신

재조합 백신(싱그릭스)이 효과가 더 높고 오래 갑니다

	생백신 (조스타박스·단종)	재조합 백신 (싱그릭스·권장)
접종	피하 1회	근육 2회(0, 2~6개월)
50~69세 효과	약 70%	97.2%
70세 이상	70대 41%, 80대 18%	91.3%
신경통 예방	66.5%	89~91%
오래 가나	10년 뒤 15%	11년 뒤 약 80%
면역저하자	금기	사용 가능



그림 · 왼쪽 옅은 방패는 생백신, 오른쪽 진한 방패는 재조합 백신의 보호를 뜻하는 설명용 그림입니다.

Tip · 생백신 조스타박스는 한국에서 2024년 5월 공급이 끝났습니다.

근거 · ZOE-50·ZOE-70 무작위 시험 · 대한감염학회 2023 권고

싱그릭스 — 부작용·비용·지원·접종 시기

대상포진을 앓았더라도 접종을 권합니다 — 10년 안에 다시 걸리는 비율이 10% 이상

부작용 — 대부분 2~3일

주사 부위 통증 78%, 근육통·피로 45%, 두통 38%, 오한 27%, 열 21%. 심각한 이상반응은 가짜약과 같았습니다(2.3% vs 2.2%).

비용(2026) — 전액 본인 부담

싱그릭스 약 25만원/회, 2회 총 40~50만원. 스카이조스터(생백신) 약 14.6만원/1회. 대상포진 백신은 모두 비급여입니다.

지자체 지원 — 해마다 바뀝니다

예시: 서울 강남구(70세 이상)·도봉구, 김포시, 가평군 등 일부 지자체가 65세 이상 무료·보조 접종. 사는 곳 보건소에 꼭 확인하세요.

앓은 뒤 언제 맞나

미국은 급성기가 끝나면 바로, 호주는 면역 정상 12개월·면역저하 3개월 뒤를 권합니다. 대한감염학회도 앓은 분께 접종을 권합니다.

Tip · 접종 시기는 진료 때 몸 상태에 맞춰 정합니다.

근거 · 국내 가격 2026 · 미국 예방접종자문위원회 · 호주 예방접종자문단 2024

바로 응급 진료가 필요한 경우

시력·청력 손실과 온몸 감염을 막기 위해 지체 없이 응급 진료가 필요한 네 가지 신호



그림 · 눈 주변 침범, 넓게 퍼진 물집, 뇌 증상이 응급 신호임을 나타낸 설명용 그림입니다.

1 눈 주변 대상포진 안과 즉시

이마·눈꺼풀·코끝에 물집 — 눈 합병증 위험 6.5배, 각막염·실명 위험이 있습니다.

2 귀 주변 물집 + 얼굴 마비 람세이 헌트

같은 쪽 얼굴 마비·청력 저하·어지럼 — 늦으면 영구 마비·청력 손실.

3 면역저하자의 온몸 퍼짐 입원

항암·이식·고용량 스테로이드 중 물집이 여러 구역으로 퍼지면 입원 치료.

4 심한 두통 · 목 뻣뻣 · 의식 변화 뇌·수막

경련이 있거나 고열·고름이 퍼지면 바로 응급 진료를 받으세요.

Tip · 코끝에 물집이 생기면 눈까지 번질 수 있다는 신호입니다(허친슨 징후).

근거 · 미국감염학회 2022 · 미국 질병통제예방센터 파종성 대상포진

일상생활, 이렇게 하세요

웁기나요 · 또 걸리나요 · 언제 출근하나요 · 씻어도 되나요



01

다른 사람에게 웁기나요?

대상포진 자체는 웁지 않지만, 물집 진물에 닿으면 수두 면역이 없는 사람은 수두에 걸릴 수 있습니다.

딱지 앓을 때까지 조심



02

또 걸릴 수 있나요?

네. 한국 연구에서 10년 안에 10% 이상, 평균 약 3년 뒤 다시 생겼습니다. 앓은 분도 백신을 권합니다.

앓았어도 백신



03

언제 출근하나요?

물집이 모두 딱지가 되고 통증이 견딜 만하면 가능합니다(보통 2~4주).

보통 2~4주



04

씻어도 되나요?

미지근한 물로 짧게 샤워해도 됩니다. 물집을 터뜨리지 말고 수건은 따로 쓰세요.

수건 따로

Tip · 임신부·신생아·면역이 약한 분과는 딱지가 앓을 때까지 접촉을 피하세요.

근거 · 미국 질병통제예방센터 대상포진 안내 · 대한감염학회 환자 안내

오늘 꼭 기억할 핵심 여덟 가지

빨리 치료하고 미리 대비할수록 합병증을 줄일 수 있습니다

01 한쪽 띠 모양 통증 + 모인 물집 = 대상포진, 대개 진찰로 바로 치료

02 물집이 생기고 72시간 안에 항바이러스제 시작이 핵심

03 등에 물집, 가슴 통증은 같은 신경이라 생기는 정상 경과

04 50세 이상은 싱그릭스 2회 접종 권장(50~69세 효과 97%)

05 앓았던 분도 회복 뒤 백신을 권합니다

06 눈 주변·코끝·이마 물집은 응급 — 바로 안과 진료

07 빠른 치료와 백신이 포진후신경통 위험을 줄입니다

08 딱지 앓을 때까지 임신부·신생아·면역저하자 접촉 피하기

Tip · 궁금한 점은 언제든지 물어보세요.

근거 · 대한감염학회 2023 · 미국감염학회 2022

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

대상포진을 앓고 있거나 예방접종을 고민하는 분을 위한 설명자료입니다. 치료와 접종은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한감염학회 2023 권고 · 미국감염학회 2022 · Cohen, NEJM 2013 · ZOE-50·ZOE-70 · Drolet 2010 ·
미국 질병통제예방센터 2024



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요