

골밀도 검사 안내

DEXA 골밀도 검사는 적은 양의 X선으로 허리뼈(요추 L1~L4)와 엉덩이뼈(대퇴골 경부)의 뼈 강도를 재서 골다공증을 일찍 진단하는 표준 검사입니다.

📌 검사 한눈에 보기

소요 시간 10~15 분	칼슘제 24h 전부터 중단	금식 불필요 평소대로 식사	방사선량 1/10 흉부 X-ray의
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

👤 측정 부위와 검사 자세



무릎 쿠션 위에서 10~15분 누운 자세

항목	내용
측정 부위	허리뼈(요추 L1~L4)와 엉덩이뼈 윗부분(대퇴골 경부)을 잽니다.
검사 자세	무릎을 쿠션 위에 올리고 반듯이 누운 채 10~15분 움직이지 않습니다.
결과 판정	척추와 고관절 중 더 낮은 쪽 점수로 판정합니다.

📋 검사 전·당일 체크리스트

⚠️ 검사 전 피할 것	📅 검사 당일 준비
- 칼슘제·종합비타민 24시간 중단 — 척추 영상에 비쳐 결과 왜곡 - 위장조영(바륨) 후 1~2주 회피 — 남은 조영제로 측정값 흐림 - 같은 날 CT 조영제 검사 금지 - 임신 가능성 미리 알리기 — X-선 노출 평가	- 편한 옷차림 — 금속 단추·지퍼·와이어 브래지어 피하기 - 금속 액세서리 제거 — 목걸이·허리띠·열쇠 - 평소 복용약 그대로 — 혈압·갑상선약은 끊지 않습니다 - 인공관절·척추 수술력 알리기

👤 권고 대상자와 결과 해석 (T점수)

이런 분께 권고됩니다	T점수	판정	그다음
65세 이상 여성, 70세 이상 남성 - 폐경 후 여성 — 저체중·가족력·흡연 시 65세 이전 - 장기 스테로이드 복용 — 3개월 이상 - 가벼운 외상으로 골절 경험 - 갑상선항진증·만성 신질환	-1.0 이상	정상	2~5년 간격으로 추적
	-1.0 미만 ~ -2.5 초과	골감소증	생활 관리 + 1~2년 뒤 재검. 골절 위험도를 계산해 높으면 약을 검토 합니다.
	-2.5 이하	골다공증	약물 치료 시작

폐경 전 여성과 50세 미만 남성은 다른 기준(Z점수)으로 봅니다. 결과는 진료 때 설명해 드립니다.

함께 보기 — 진료실에서 보신 설명 자료 「골다공증 환자교육」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/osteoporosis/

