

경동맥 초음파에서 플라크가 보였다면

벽 두께, 플라크, 혈관이 좁아진 정도(협착률)는 서로 다른 소견입니다. 플라크가 보였다고 바로 시술이 필요한 것은 아니며, 대부분은 약물치료와 생활관리로 관리합니다.

검사 결과에서 보는 핵심



벽 두께
1mm↑

동맥경화 시작 신호

협착 정도
70%↑

스텐트·수술 고민

LDL 목표

< 70

플라크 있으면 강화(mg/dL)

생활관리

금연

약 빠짐없이 복용

스타틴과 LDL 목표

스타틴이 하는 일

- 스타틴은 **진행을 늦추고 플라크를 안정시켜**, 터져서 혈전이 되는 위험을 낮춥니다.
- 혈관은 **젊을 때로 되돌릴 수 없습니다**.

LDL 목표와 복약

- 플라크가 있으면 **LDL 목표가 70 아래로 내려갑니다**.
- 처방받은 약을 **빠지지 않고 먹고, 금연합니다**.

생활에서 지킬 것

꼭 할 것

- 처방받은 약을 **빠짐없이 복용합니다**.
- 금연합니다**.
- 진료실에서 정한 간격으로 **정기 추적검사**를 받습니다.

피해야 할 것

- 목 **마사지나 경락**은 피합니다.
- 혈액순환제**라는 이름만으로 **작용을 판단할 수 없습니다**. 복용 중인 제품을 알려주시고 처방약을 대신하지 마세요.
- 임의로 약을 중단하거나 용량을 조절하지 않습니다.

흔한 오해 바로잡기

흔한 오해	의학적 사실 (바로 알기)
"혈액순환이 잘 되면 플라크가 떨어진다"	플라크는 없애는 대상이 아니라 안정시키는 대상입니다.
"경동맥이 괜찮으면 LDL이 높아도 된다"	검사 한 곳의 결과만으로 전체 혈관 위험을 판단할 수 없습니다.

즉시 응급실로 가야 하는 경우

갑자기 **한쪽 팔·다리에 힘이 빠지거나, 말이 어눌해지거나, 한쪽 눈이 갑자기 안 보이면** 증상이 금방 좋아지더라도 즉시 119를 부르거나 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 한국 이상지질혈증 진료지침 제5판 · Carotid Arterial Plaque Ultrasound Consensus(J Am Soc Echocardiogr 2020) · Atherosclerotic Plaque Stabilization and Regression(Nat Rev Cardiol 2024)

본 자료는 일반적 안내이며 실제 협착 정도·위험인자에 따라 방침이 달라집니다. 시술·약물 결정은 담당 의사와 상담하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/carotid-plaque/

