

이소트레티노인 처방 동의서


여드름 치료제 이소트레티노인(Isotretinoin)을 처방받기 전, 의사의 설명을 듣고 이 쪽을 직접 읽어 보신 뒤 2쪽에 확인·서명해 주세요.

복용하는 동안 반드시 지킬 것

구분	지킬 내용	이유
임신	복용 중, 그리고 복용을 끝낸 뒤 1개월 안 에는 임신하면 안 됩니다.	용량·기간과 상관없이 태아의 뇌·심장 등에 심한 기형 위험이 매우 높고, 유산 위험이 커지며 조산도 보고됐습니다.
피임 (가임기 여성)	복용 시작 1개월 전부터 끝낸 뒤 1개월까지 서로 보완하는 피임법 2가지 를 함께 씁니다(예: 루프·복합 피임약 + 콘돔). 에스트로겐 없는 저용량 프로게스테론 단일 먹는 피임약은 쓰지 않습니다.	한 가지만으로는 실패할 수 있고, 단일 피임약은 이 약과 함께 쓰면 효과가 줄 수 있습니다.
헌혈	복용 중, 그리고 끝낸 뒤 1개월 동안 헌혈하지 않습니다.	수혈받은 임신부의 태아가 약에 노출될 수 있습니다.
약 나누기	다른 사람에게 주거나 팔지 않고, 남은 약은 약국에 반납 합니다.	처방받은 본인만 복용해야 하는 약입니다.
같이 먹지 말 것	테트라사이클린계 항생제 (독시사이클린·미노사이클린 등), 비타민 A 보충제 , 세인트존스워트(St. John's wort) 허브 제품은 함께 먹지 않습니다.	뇌압 상승(가성뇌종양)·비타민 A 과다 증상, 호르몬 피임약 효과 저하 위험이 있습니다.
피부 시술	복용 중과 끝낸 뒤 5~6개월까지 화학 박피·레이저 시술·왁스 제모를 피합니다.	흉터·염증·색소 침착 위험이 있습니다.

정기 검사 일정

검사	언제 받나요
임신 검사 (가임기 여성)	처방 전 2회 음성 확인(2번째는 복용 직전 생리 시작 5일 안, 생리가 없으면 피임 없는 성관계 뒤 11일 이상 지나서) → 복용 중 매달 처방 전 → 끝낸 뒤 5주까지 매달 . 약은 한 번에 1개월분을 넘겨 처방하지 않으며, 처방전은 7일 안에 조제받아야 합니다.
혈액 검사 (모든 환자)	간 수치·공복 혈중 지질 을 복용 전, 복용 1개월 뒤, 이후 3개월마다 검사합니다. 당뇨·비만·알코올 의존·지질 이상이 있으면 혈당과 함께 더 자주 봅니다.



시작 1개월 전 복용 중 끝낸 뒤 1개월
세 기간 내내 피임 2가지 · 헌혈은 복용 중~끝낸 뒤 1개월 금지

부작용 — 흔한 것과 바로 연락할 것

알아 둘 부작용과 대처

입술·피부·코·눈 건조, 입술염 — 보습제·입술 보호제를 쓰고 햇빛·자외선은 피하세요. 코가 마르면 코피가 날 수 있습니다.
근육통·관절통 — 격한 운동을 하면 더 잘 생길 수 있습니다.
매우 드물게 **밤에 잘 안 보이거나** 콘택트렌즈가 불편할 수 있습니다 — 밤 운전을 조심하고, 필요하면 안경을 쓰세요.
여드름이 처음에 심해져도 보통 7~10일 뒤 나아집니다.

이럴 땐 바로 병원에 연락하세요

우울감이 생기거나 심해질 때, 자살 생각 — 복용을 멈추고 바로 연락하세요.
두통과 구역·구토·시야 흐림(뇌압 상승 신호), 시력 변화
복통, 혈변, 심한(피 섞인) 설사 — 복용을 멈추고 연락하세요.
물집·점막이 허는 심한 피부 발진, 심한 알레르기 반응 — 복용을 멈추고 연락하세요.

확인 및 서명

이해한 문항만 네모 칸에 직접 표시하고, 모르는 문항은 의사에게 다시 물어봐 주세요.

● 모든 환자 확인

- ☐ 이 약은 **태아 기형**을 일으킬 수 있어 임신 중에는 복용할 수 없고, 가임기 여성은 **피임·임신 검사 조건을 모두 지킬 때만** 복용할 수 있다는 설명을 들었습니다.
- ☐ 약을 **다른 사람에게 주거나 팔지 않고**, 치료가 끝나면 남은 약을 약국에 반납하겠습니다.
- ☐ 복용 중과 복용을 끝낸 뒤 **1개월 동안 헌혈하지 않겠습니다.**
- ☐ **테트라사이클린계 항생제·비타민 A 보충제**를 함께 먹지 않고, 새 약이나 영양제를 먹기 전에는 의사·약사와 상의하겠습니다.
- ☐ 콩·땅콩·대두류 알레르기, 간·신장 질환, 매우 높은 혈중 지질, 우울증 병력이 있으면 **의사에게 알렸습니다.**
- ☐ 복용 전·중에 **간 수치·혈중 지질 검사**를 정해진 때에 받겠습니다.
- ☐ **혼한 부작용**(건조·코피·근육통)과 매우 드물게 생기는 밤 시력 저하, 그 대처법을 들었고, 끝낸 뒤 5~6개월까지 박피·레이저·왁스 제모를 피하겠습니다.
- ☐ **우울감·자살 생각, 복통·혈변, 심한 발진·알레르기**가 생기면 복용을 멈추고, 이 증상이나 두통·시아 이상이 생기면 바로 병원에 연락하겠습니다.

♀ 가임기 여성 추가 확인 (임신 가능성이 있는 여성만 표시)

- ☐ 현재 **임신 중이 아니고, 수유 중도 아닙니다.**
- ☐ 복용 **시작 1개월 전부터 복용 중, 끝낸 뒤 1개월까지** 서로 보완하는 **피임법 2가지**를 함께 쓰겠습니다.
사용할 피임법: ① _____ ② _____
- ☐ 처방 전 **임신 검사 2회**, 복용 중 **매달 처방 전**, 끝낸 뒤 **5주까지 매달** 임신 검사를 받겠습니다(약은 한 번에 1개월분 이내).
- ☐ 피임을 해도 **실패할 수 있다**는 설명을 들었습니다. 생리가 늦어지거나 임신이 의심되면 **바로 병원에 연락해 진찰**을 받겠습니다.
- ☐ 불임·무월경이거나 성관계가 없어 평소 피임하지 않더라도 복용 중에는 위 피임이 권장된다는 설명을 들었습니다.

나는 1·2쪽 내용을 의사에게 듣고 이해했으며 질문할 기회가 있었습니다. **이소트레티노인 복용에 동의합니다.**

구분	성명	생년월일 · 관계(대리인)	서명	날짜
환자				
법정대리인 (미성년자인 경우)				
설명한 의사		—		



임신 의심, 우울감·자살 생각, 두통·시아 이상, 복통·혈변이 생기면 031-893-4560으로 바로 연락하세요. 진료 시간 외 자살 생각·심한 증상은 가까운 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 식품의약품안전처 허가사항: 이소티논연질캡슐(이소트레티노인) 사용상의 주의사항(2024-11-04 변경) · 같은 제품 임신예방프로그램 환자용·전문가용 안내서 · 식약처 이소트레티노인 안전사용 안내(2022)

이 서식은 처방 전 설명과 확인을 돕는 양식입니다. 작성한 서식은 진료 기록과 함께 보관합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/forms/isotretinoin-consent/