

용종절제술 후 주의사항

대장 안 용종을 떼어 낸 자리에는 작은 상처가 남습니다. 며칠 뒤 다시 피가 나는 지연출혈은 드물지만 2주 안에도 생길 수 있어, 아래 기준을 보호자와 함께 확인해 주세요.

💧 2주 동안 살펴볼 것 — 피와 통증

지켜봐도 됩니다	🚑 바로 119 또는 응급실로 가세요
• 휴지에 살짝 묻는 피 — 지켜봅니다. • 배가 뻥뻥함·방귀 — 검사 때 넣은 공기 때문이며 1~2일 안에 좋아집니다.	• 피 — 변기 물이 붉어짐, 검붉은 피나 짜장면처럼 검은 변, 피덩어리 • 어지러움 — 식은땀, 쓰러질 것 같음, 얼굴이 창백함 • 복통 — 점점 심해짐, 배가 심하게 뻥뻥함(드물게 장에 구멍이 생긴 신호) • 열·구토·숨참 — 38°C 이상 발열, 오한, 반복 구토, 숨이 참

🍴 먹기·움직이기 — 기간별 기준



언제	기준
오늘	물부터 마시고 미음·죽·부드러운 음식을 조금씩 드세요.
24시간	수면(진정) 뒤 운전·기계 작업·요리·술·중요한 결정 을 하지 마세요.
1~2일	증상이 없으면 부드러운 일반식. 맵고 기름진 음식, 씨앗·견과·질긴 고기는 줄입니다.
2주	큰 용종(1cm 넘음)·소작·점막절제술(EMR) 을 했다면 무거운 물건·격한 운동·사우나·장거리·해외여행·술을 피하세요.

🩺 약 다시 먹기 — 스스로 판단하지 마세요

피를 묽게 하는 약	아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·아픽사반(엘리퀴스)·리바록사반(자렐토) 등은 진료실에서 적어 드린 날짜대로만 다시 드세요.
📅 진료실 기입란	약 이름 _____ 다시 먹는 날 _____ 월 _____ 일 _____ 시
날짜가 없거나 이상할 때	날짜를 못 받았거나 휴지에 묻는 정도의 피가 있으면 먹기 전에 전화로 확인 하세요. 위 응급 신호가 있으면 전화를 기다리지 말고 바로 119·응급실 로 가세요. 심장 스텐트·뇌졸중·심방세동·혈전 병력이 있으면 스스로 끊거나 미루지 마세요.
진통제	아세트아미노펜(타이레놀) 을 먼저 드세요. 이부프로펜·나프록센 같은 소염진통제는 의사 지시 전에는 피하세요.

📋 조직검사 결과와 다음 대장내시경

📞 결과 안내	떼어 낸 용종은 현미경 검사로 종류와 위험도를 확인합니다. 결과는 약 1~2주 뒤 외래 또는 전화로 알려 드립니다. 결과를 받지 못하셨다면 꼭 병원에 전화해 확인 하세요.
다음 대장내시경	용종의 크기·개수·조직 결과로 정합니다. 자세한 기준은 대장용종 결과지 읽는 법 을, 진료실 설명 자료는 용종절제술 후 관리 슬라이드 를 보세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560 (진료시간 전화 상담)

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — BSG/ESGE 항혈전제 내시경 지침(Gut 2021) · ACG-CAG 항혈전제 지침(2022) · NHS 용종절제 후 관리 안내

용종 절제 잘 받으셨습니다. 본 안내는 일반 권고이며 떼어 낸 용종의 크기·개수·복용약에 따라 담당 의사의 지시가 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-polypectomy/