

금연 — 챔픽스 복용법과 무니코틴 전략

금연은 니코틴 중독과 행동(습관) 중독, 두 가지를 함께 다루는 과정입니다. 챔픽스(바레니클린)는 정해진 순서대로 증량하며, 84일을 다 채운 사람이 다시 피우는 비율이 낮습니다.

TITRATION SCHEDULE

정해진 순서대로 늘려
가세요

84 일 (표준 치료기간)

식후 바로 드시면 메스꺼움이 줄어듭니다. 물과
함께 복용하세요.

기간	용량	함께 할 일
1~3일째	0.5mg 하루 1회	식후 물과 함께 시작합니다
4~7일째	0.5mg 하루 2회	하루 2회로 늘립니다
8일째부터	1mg 하루 2회	이 무렵 금연일을 정합니다

복용 중 알아두기 (Daily Notes)



식사 직후 · 물 한 컵과 함께

TAKE WITH

식후 · 물

메스꺼움 완화

SLEEP ISSUE

악몽·불면

저녁 약 시간 조절은 진료 시 상의

RESTART RULE

0.5mg부터

장기간 중단 후 재도전 시 처음 용량으로

FULL COURSE

84일

12주 완주가 원칙

중독의 두 축 (Two Sides of Addiction)

니코틴 중독 · 챔픽스가 돕는 부분

1. 갈망·금단 증상 완화 — 담배 생각과 니코틴 금단 증상을 줄여 줍니다.
2. 흡연 만족감 차단 — 중간에 한 대를 피워도 예전만큼 만족스럽지 않게 합니다.
3. 보통 12주(84일) 치료 — 용량과 기간은 효과·부작용에 따라 담당 의사가 조정합니다.

행동(습관) 중독 · 스스로 관리할 부분

1. 계기 상황 미리 알아두기 — 식후·커피·스트레스처럼 담배가 떠오르는 순간을 파악합니다.
2. 술자리가 가장 큰 고비 — 미리 대처 계획을 세워 두세요.
3. 무니코틴 전자담배로 니코틴부터 끊는 방법도 있습니다 — 행동(습관)은 나중에 끊는 방식이며, 진행 여부는 진료 시 상의하세요.
4. 한 번 피웠다고 포기하지 마세요 — 복용을 멈추지 말고 계속 이어가세요.

바로 연락·응급실이 필요한 경우 (Call Clinic / ER)

이런 증상이 생기면	이렇게 하세요
자살 생각, 갑작스럽고 심한 기분·행동 변화	즉시 복용을 멈추고 연락하세요. 실행할 생각이나 충동이 있으면 119에 연락하거나 응급실로 가세요.
얼굴·입술·혀·목 부종, 호흡곤란	응급 상황이니 바로 응급실로 가거나 119 에 연락하세요.
입안 등 점막 병변을 동반한 발진	즉시 복용을 멈추고 응급실로 가세요.
경련(발작)	즉시 복용을 멈추고 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 국가암정보센터 「금연 약물요법」(2023) · WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults (2024) · Cochrane Database Syst Rev 2016(PMID 27158893) · Lancet 2016 EAGLES(PMID 27116918) · Nicotine Tob Res 2019(PMID 29986105). 본 자료는 일반 복약 안내이며 개인 증상과 제시작 시점은 담당 의사의 판단을 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/smoking-cessation-varenicline/