

티옥트산과 칼슘·비타민 D, 같이 드실 때

티옥트산(알파리포산)과 칼슘·비타민 D 복합제는 함께 처방받아 드실 수 있습니다. 다만 **같은 시간에 한꺼번에 드시지 말고**, 먹는 때를 나눠 주세요.

가장 쉬운 기억법



아침 공복엔 티옥트산, 저녁 식사 땀 칼슘·비타민 D

아침에는 티옥트산, 저녁에는 칼슘·비타민 D

중요한 것은 두 약을 **같은 시간에 한꺼번에 먹지 않는 것**입니다. 티옥트산은 칼슘이나 철·마그네슘 같은 미네랄과 같이 먹으면 장에서 서로 붙어 흡수가 떨어질 가능성이 있습니다.

하루 복용 순서

때	드실 약	이렇게 하세요
① 아침에 일어나서	티옥트산을 물과 함께 먼저 드세요.	빈속에 드시는 약입니다.
② 약 30분 뒤	아침식사를 하세요.	티옥트산을 먹고 30분 정도는 빈속으로 기다립니다.
③ 저녁 식사 때 (또는 점심)	칼슘·비타민 D 복합제를 식사와 함께 드세요.	저녁이 가장 권장되고, 점심도 괜찮습니다.

자주 묻는 질문

질문	답
두 약을 한 번에 같이 먹어도 되나요?	권하지 않습니다. 허가 설명서에 칼슘이 든 약·음식과 동시에 먹지 말라고 적혀 있습니다. 다만 흡수가 얼마나 줄어드는지 사람에서 켄 연구는 근거 자료 조사에서 찾지 못했습니다.
꼭 정확히 4시간을 떼야 하나요?	시계로 4시간을 쥔 필요는 없습니다. 정확히 4시간이어야 한다는 임상시험 근거는 없습니다. 칼슘을 다음 식사(점심·저녁)로 미루면 대개 그 이상 자연스럽게 떨어집니다.
2시간밖에 못 떼면요?	동시에 먹는 것보다는 낫습니다. 하지만 2시간이면 충분하다는 확인된 근거는 없으니, 가능하면 점심이나 저녁으로 옮겨 주세요.
비타민 D 흡수도 떨어지나요?	티옥트산이 비타민 D 흡수를 떨어뜨리는지는 확인된 자료가 부족합니다. 주의할 것은 칼슘 같은 미네랄 쪽입니다.

이렇게 드세요 vs 피하세요

이렇게 드세요

티옥트산은 빈속에 — 밥을 먹고 바로 먹으면 흡수가 줄어든다는 연구가 있습니다.

칼슘·비타민 D는 식사와 함께 — 흔히 쓰는 탄산칼슘은 식사와 함께 먹으면 잘 녹는 데 도움이 됩니다.

미네랄 든 종합비타민·철분제·마그네슘제도 티옥트산과 떼어 점심·저녁에 드세요.

피하세요

두 약을 같은 시간에 한꺼번에 먹기

티옥트산을 우유와 함께 먹기 — 우유도 칼슘이 든 음식입니다.

효과가 적다고 스스로 양 늘리기 — 먼저 먹는 시간과 함께 먹는 음식·영양제를 진료 때 함께 확인합니다.

진료 때 꼭 말씀해 주세요

인슐린·혈당약을 함께 쓰시는 분

티옥트산이 혈당약의 효과를 더 세게 할 수 있다고 제품설명서에 적혀 있습니다.

티옥트산을 처음 시작하거나 바꿀 때는 혈당을 더 챙겨 재고, **혈당 기록을 진료 때 보여 주세요.**

칼슘 수치를 확인해야 하는 분

콩팥병·요로결석·부갑상선 기능항진증이 있거나, 칼슘·비타민 D를 오래 많이 드시는 분

처방용 **활성형 비타민 D(칼시트리올)**를 드시는 분 — 필요하면 혈액검사로 칼슘 수치를 봅니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 티옥트산 600mg 허가 설명서 · 독일 Thioctacid 600 HR 제품설명서 · Gleiter et al., Eur J Clin Pharmacol 1996(음식과 티옥트산 흡수) · Recker, NEJM 1985 · NIH ODS 칼슘·비타민 D 전문가용 자료 · 원장 검토 자료(2026-09-27)

본 자료는 일반 복약 안내이며 개인 처방은 담당 의사의 지시를 우선합니다.

집에서 다시 보기

