헬리코박터 제균 치료 안내

처방받은 약의 복용 시간과 함께 먹는 약을 확인하는 복약 안내입니다.

복용 시간표

처방받은 약은 **모두 하루 2번, 아침·저녁 식사 직후에 함께** 드세요.
위산억제제('-프라잔' 계열)는 식사와 관계없이 먹어도 되는 약입니다.

약 이름	하루 횟수
위산억제제('-프라잔' 계열) · 전 요법	하루 2번(아침·저녁)
아목시실린 · 삼제·동시	하루 2번(아침·저녁)
클래리스로마이신 · 삼제·동시	하루 2번(아침·저녁)
메트로니다졸 · 동시·4제	하루 2번(아침·저녁)
비스무트·테트라사이클린 · 4제	하루 2번(아침·저녁)



식사 마치고
처방받은 약 모두 함께

삼제 14일 · 동시 10일 · 비스무트 4제 10일 또는 14일 — 처방 시간표가 다르면 처방이 우선입니다.

함께 먹는 약 — 미리 알려 주세요

아래 약을 드시면 **스스로 끊거나 용량을 바꾸지 말고** 알려 주세요. 조정 방법을 안내해 드립니다.

클래리스로마이신 · 삼제·동시 요법

고지혈증약 심바스타틴·로바스타틴 — 같이 쓰면 안 됩니다. 치료 기간 잠시 쉽니다.

아토르바스타틴 — 하루 20 mg을 넘지 않게 조정이 필요합니다.

콜히친(통풍약) — 용량 조정이 필요합니다. 콩팥·간 기능이 나쁘면 함께 쓰지 않습니다.

에르고타민(편두통약) — 같이 쓰면 안 됩니다.

트리아졸람·미다졸람(수면·진정제) — 진정 작용이 세지고 길어집니다.

퀴니딘·디소피라미드(부정맥약), QT 연장(심전도 이상) — 위험하니 미리 알려 주세요.

사이클로스포린·타크로리무스 — 상호작용이 있으니 미리 알려 주세요.

클래리스로마이신 또는 메트로니다졸 삼제 · 동시 · 4제 요법

와파린 — 항응고 작용이 강해지고 출혈 위험이 커집니다.

피가 굳는 정도를 보는 **혈액검사(INR)를 자주 확인**해야 합니다.

테트라사이클린 · 4제 요법만 해당

칼슘·마그네슘·알루미늄 제산제, 철분·아연 제제, 우유·유제품은 테트라사이클린과 **같은 때 드시지 마세요.**

위산억제제가 PPI(오메프라졸 등)일 때

클로피도그렐을 드시면 미리 알려 주세요.

오메프라졸·에스오메프라졸과 함께 쓰지 않도록 약을 확인합니다.

술 · 약을 빠뜨렸을 때

메트로니다졸(동시·4제) 복용 중과 **마지막 복용 뒤 72시간(3일)까지 금주**하세요.

술과 만나면 심하게 두근거리고 토하거나 얼굴이 붉어집니다.

깜빡했어도 **다음에 두 배로 드시지 말고 진료실로 연락**주세요. 빠뜨리면 내성이 생겨 다음 치료가 어려워집니다.

속이 편해져도 **처방 날짜를 다 채워야** 제균이 끝납니다.

흔한 부작용 — 대개 괜찮습니다

- **메스꺼움·입맛 없음** — 식사와 함께 드시면 나아집니다.
- **쇠 맛** — 약을 끊으면 원래대로 돌아옵니다.
- **검은 변** — 대개 비스무트 때문입니다.
- **가벼운 설사·두통** — 며칠 안에 좋아집니다.

10명 중 2~3명이 겪지만, 이 때문에 약을 중단하는 경우는 드뭅니다.

즉시 연락 · 응급 신호

온몸 발진·심한 가려움 / 눈·피부 노래짐

물설사 하루 6번 이상 → 바로 연락하세요.

짜장처럼 검고 끈적한 변이나 어지럼 → 응급실

발열·물집·입안 등 점막 병변 → 응급 평가

숨쉬기 힘들거나 얼굴·입술 부음 → 119

지사제를 임의로 드시지 말고
031-893-4560 먼저 연락하세요.

치료가 끝나면 — 균이 없어졌는지 재검사합니다

약을 끝내고 **4주 이상 뒤 요소호기검사**를 받습니다. 양성이면 2차 치료를 합니다.

검사 전 **위산억제제 2주·항생제 4주 중단**
· **검사 4시간 전부터 금식(물도 안 됨)**

왜 치료하나요

한국 성인 감염률 **30%** · 10명 중 3명

감염 시 위암 위험 **약 6배** · WHO 1군 발암요인

제균 후 위암 **35% ↓** · 궤양 재발 크게 감소

균을 없애는 것 자체가 치료이며, 치료 뒤 재감염은 **한 해 2~3%** 정도로 드뭅니다. 여럿이 먹을 땐 **덜어 드시고**, **잔 돌리기**는 피하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

근거 — 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침(2025) · 미국 FDA 허가사항(DailyMed) · 미국 국립의학도서관 메트로니다졸 복약정보(MedlinePlus)

처방 약제와 기간은 환자분마다 다를 수 있습니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/h-pylori-eradication/