밤에 종아리에 쥐가 나면

쥐(근육 경련)는 근육이 **갑자기 오그라들며 뭉치는** 거예요. 자기 전에 종아리를 **늘려 두면** 줄이는 데 도움이 될 수 있어요(완전히 막지는 못해요).

① 자기 전, 벽 짚고 종아리 늘리기



1. 벽을 보고 **두 손을 가슴 높이로** 대요.
2. 늘릴 다리를 **한 걸음 뒤로**. 무릎은 쭉 펴요.
3. 뒤 다리 **뒤꿈치를 바닥에 붙이고** 앞 무릎을 굽혀 몸을 벽 쪽으로.
4. 종아리가 **당기면 10초 버티기**. 숨은 참지 마세요.

> "이 발뒤꿈치를 바닥으로 이렇게 **붙이는 거예요.** … 쭉쭉 늘어나거든요."

매일 자기 전	**10초 × 3번** (사이 10초 쉬기)	**양쪽 다리**

② 이것도 알아 두세요

쥐가 났을 때	**발끝을 몸 쪽으로 당기거나** 주물러 주세요.
서서 하기 힘들면	다리를 펴고 앉아 **발끝을 몸 쪽으로** 당겨요.
마그네슘	나이 드신 분 예방엔 **효과가 거의 없어요**(임신 중은 상의).

걷다가 아픈 경우는 다릅니다. 일정 거리를 걸을 때 반복되고 서서 쉬면 풀리는 통증은 혈관 평가가 필요합니다. 쥐에는 퀴닌을 권하지 않으며, 마그네슘은 결핍이 확인되면 보충합니다.
아산 28회 연수강좌 — 말초동맥질환, 언제 의심하고 어떻게 치료할까?(김태오)

한쪽 다리가 붓거나 계속 아프면 **빨리 진료**, 숨참·가슴 통증까지 오면 **119**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진
근거 — Hallegraeff 2012 시험 · Cochrane 2021·2020 · 영국 NHS 다리 쥐·혈전 안내 · bpac NZ 2012
교육·참고용 안내문입니다. 원인과 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/night-calf-cramp-stretch/