성인 대상포진 예방접종 안내

2026년 최신 권고 기준 — 백신 종류와 접종 대상을 앞면에, 접종 일정·과거 이력·비용을 뒷면에 정리했습니다.

대상포진 백신, 왜 맞아야 하나요?

대상포진은 어릴 때 앓은 **수두 바이러스**가 몸속 신경에 숨어 있다가, **나이가 들거나 면역이 떨어질 때** 다시 활동하면서 생깁니다. 심한 통증과 물집뿐 아니라, 발진이 나은 뒤에도 오래가는 **대상포진 후 신경통**이 남을 수 있어 삶의 질을 크게 떨어뜨립니다. **50세 이상**이거나 **면역이 약한 분**은 예방접종으로 발병과 신경통을 크게 줄일 수 있습니다.

어떤 백신이 있나요? 국내 접종 가능 2종

싱그릭스
우선 권고 · 재조합(사백신)
2회 접종 · 근육주사
효과 강하고 오래감

스카이조스터
대안 · 생백신
1회 접종 · 피하주사
면역저하자에게는 금기

비교	싱그릭스 (재조합)	스카이조스터 (생백신)
접종 횟수	**2회** (근육주사)	1회 (피하주사)
예방 효과	**50~60대 약 97%**, 70대 이상도 **90% 이상**	50대 약 70% → 나이 들수록 낮아짐(80대 약 18%)
효과 지속	**10년 이상** 유지	최대 약 8년, 점차 감소
면역저하자	**접종 가능** (유일한 선택지)	**접종 금기**
접종 후 반응	통증·근육통·발열이 비교적 흔함(강한 면역반응)	상대적으로 적음


※ 수입 생백신 **조스타박스**는 국내 공급이 중단되어 현재 접종할 수 없습니다. 효과 수치는 대규모 임상연구 기준의 대략값이며 개인차가 있습니다.

누가 맞아야 하나요?

만 50세 이상
건강해도 접종 권장
싱그릭스 2회가 표준

만 18세 이상 면역저하
항암·이식·면역억제제 등
싱그릭스만 · 생백신 금기

만 50세 미만 건강한 성인
정기 접종 대상은 아님
필요 시 상담



신경에 숨은 바이러스가 다시 활동 → 몸 한쪽 띠 모양 물집

핵심만 기억하세요

건강한 50세 이상은 **싱그릭스 2회**가 표준입니다(원하면 생백신 1회도 대안). **면역이 약한 분**은 **생백신은 절대 금기**이므로 **싱그릭스만** 맞습니다. 국가무료 대상은 아니지만 **용인시 거주 만 65세 이상**은 시 지원으로 **생백신을 무료**로 맞을 수 있습니다(뒷면).

이미 물집이나 한쪽 띠 모양 통증이 생겼다면 — 백신이 아니라 치료가 먼저입니다. 증상이 시작되고 72시간 안에 진료를 받으세요(항바이러스제).

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

근거 — 대한감염학회(KSID) 성인 예방접종 권고 · 질병관리청(KDCA) 예방접종 지침 · 미국 CDC(2024)

본 자료는 대한감염학회(KSID)·질병관리청(KDCA) 가이드라인에 기반한 일반 교육 자료이며 특정 제품 광고가 아닙니다. 개인별 접종은 나이·과거 접종력·기저질환에 따라 달라질 수 있어 반드시 진료 상담 후 결정합니다.

대상포진 접종, 어떻게 맞나요?

싱그릭스 접종 스케줄 2번째 주사가 중요합니다

면역정상(일반) 1차 → 2~6개월 → 2차

— 빠른 완료가 필요한 경우 —

면역저하자 1차 → 1~2개월 → 2차

2차 접종이 늦어져도 **처음부터 다시 맞지 않고 2차만** 완료하면 됩니다(최소 간격 4주). 면역저하자는 치료 시작 전 접종을 마치는 것이 좋아 **1~2개월로 앞당길 수 있으며**, 정확한 시점은 주치의와 정합니다.

항암치료 중에도 계획을 세웁니다. 싱그릭스는 항암치료 중에도 접종할 수 있는 재조합 백신입니다. 가능하면 치료 시작 전에 계획하고 항암 일정·면역 상태를 함께 확인합니다. 면역저하 상태에서는 생백신을 맞지 않습니다.
아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)

대상별 권장 (처음 맞는 경우)

대상	권장	간격
만 50세 이상 (건강)	**싱그릭스 2회** 우선 / 대안: 스카이조스터 1회	2~6개월
만 18세 이상 면역저하	**싱그릭스만** · **생백신 금기**	1~2개월
만 50세 미만 (건강)	정기 접종 대상 아님 — 필요 시 상담	—

과거에 앓았거나 접종했다면

상황	어떻게 하나요
과거에 대상포진을 앓음	여전히 접종 대상입니다. 국내(질병관리청)는 보통 **회복 후 6~12개월** 지나 접종을 권합니다. 미국(CDC, 2024)은 정해진 대기기간 없이, 급성기가 지나 증상이 가라앉으면 바로 맞아도 된다고 봅니다.
과거에 생백신을 맞음	조스타박스(Zostavax) 접종 후 **최소 8주**가 지났다면 싱그릭스 2회 접종을 상담합니다. 다른 생백신은 종류·접종일을 확인해 개별 결정합니다. 아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호)
싱그릭스 1회만 맞고 중단	다시 시작할 필요 없이 **2차만** 완료하면 됩니다.

싱그릭스는 **사백신**이라 독감·폐렴구균·코로나19 등 대부분의 백신과 **같은 날 다른 부위**에 접종할 수 있습니다. · 해외(미국) 자료와 국내 권고가 다른 부분(생백신 후 재접종 간격, 앓은 뒤 접종 시점 등)은 **국내(대한감염학회·질병관리청) 기준**을 따릅니다.

비용 · 지원 안내 전액 비급여 (국가무료 아님)

백신	접종	광교바른내과 접종가
스카이조스터 (생백신)	1회	**14만원**
싱그릭스 (재조합)	2회	1회 **25만원** · 2회 총 **48만원**

용인시 대상포진 무료 예방접종 (2026)

대상 용인시 1년 이상 거주 **만 65세 이상** 미접종자(생백신 1회 **무료**) · **시기** 만 75세 이상(1951.12.31. 이전 출생) **7월 셋째 주부터** / 만 65~74세(1952.1.1.~1961.12.31.) **7월 다섯째 주부터** · **장소** 용인시 관내 위탁의료기관(**본원 포함**)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

근거 — 대한감염학회(KSID) 성인 예방접종 권고 · 질병관리청(KDCA) 예방접종 지침 · 미국 CDC(2024)

함께 보기 — 대상포진이라는 병(경과·치료·신경통·응급 신호)은 진료실 설명 슬라이드 「대상포진」
edu.gwanggyobarun.com/decks/infectious/herpes-zoster/

실제 접종 백신·간격·횟수·비용은 개인의 접종력과 건강상태에 따라 진료 상담 후 결정됩니다. 특정 제품을 권유·광고하지 않습니다.

모바일로 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/vaccine/shingles-adult-2026/