급성 장염, 제대로 마시고 단계별로 먹기

물부터 채우고(탈수 신호면 경구수액제), 회복 단계에 맞춰 먹는 식사 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

대부분 7일 이내, 저절로 좋아집니다

급성 장염은 물과 식사만 잘 챙겨도 대부분 회복됩니다 — 핵심은 약이 아니라 수분입니다

7일

대부분 좋아지는 시기

1주일 안에 증상이 가라앉습니다

14일

길어도 이 안에

2주를 넘기면 다시 진료를 받습니다

2~4주

우유를 조심할 기간

장염 뒤 우유 소화가 잠시 어려워집니다

가장 흔한 합병증은 탈수입니다

수분 보충이 치료의 중심입니다. 설사가 잦거나 어지러우면 **경구수액제**를 먼저 마십니다.

오래 굶으면 오히려 늦게 낫습니다

구토가 가라앉으면 되도록 빨리 **부드러운 식사**를 다시 시작하는 것이 회복을 앞당깁니다.

Tip · 입이 마르고 소변이 줄었다면 먹는 것보다 마시는 것을 먼저 챙기세요.

근거 · WHO 설사 치료 지침 · ESPGHAN 2014

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

급성 장염 — 위장관 감염으로 설사·구토가 생기는 흔한 병

하루 3회 이상 묽은 변, 구토, 복통, 38°C 이상 열이 함께 올 수 있습니다

이런 병입니다

바이러스·세균 감염으로 설사·구토·복통·발열이 생기며, 대부분 **7~14일 안에** 저절로 좋아집니다.

‘죽만 먹어야 한다’는 옛 통념

바나나·쌀·사과·토스트만 먹는 식단이나 죽만 고집하면 **단백질·영양이 부족**해 회복이 늦어집니다.

지금의 권고 — 두 가지가 핵심

① 물·보리차, 탈수 신호엔 경구수액제로 **탈수 막기** ② 다양한 부드러운 음식을 **일찍 다시 먹어** 장 점막 회복 돕기.




그림 · 물과 부드러운 음식으로 장을 지키고, 매운 음식·커피는 잠시 쉽니다(설명용 그림).

Tip · 오래 굶는 것보다 조금씩 자주 먹는 것이 장에 더 좋습니다.

근거 · WHO 설사 치료 지침 · ESPGHAN/ESPID 2014

식사 관리의 기본 여섯 가지

반드시 기억해야 할 원칙 — 물, 이른 식사, 다양한 음식

① 물 보충이 먼저

물·보리차·맑은 국물을 조금씩 자주. 설사가 잦거나 어지러우면 약국 **경구수액제**를 먼저 마십니다.

② 식사는 일찍 다시

구토가 가라앉으면 미음·죽부터 시작해 단계적으로 늘립니다. 오래 굶으면 회복이 늦습니다.

③ 죽만 먹지 않기

두부·계란·흰살 생선처럼 **부드러운 단백질**을 함께 드세요. 바나나·쌀·사과·토스트만으로는 부족합니다.

④ 자극적인 음식 피하기

매운 것·기름진 것·카페인·탄산·단 음료는 장을 자극합니다. 좋아진 뒤 3~5일까지 줄입니다.

⑤ 우유·유제품은 잠시 쉬기

장염 뒤 2~4주는 우유 소화가 어려울 수 있습니다. 요거트 같은 유제품도 나은 뒤에 드세요.

⑥ 항생제는 대부분 필요 없음

대부분 바이러스성이라 항생제를 쓰지 않습니다. 혈변·고열 등 세균이 의심될 때만 의사가 처방합니다.

Tip · 이 여섯 가지만 지켜도 대부분 1주 안에 회복됩니다.

근거 · WHO 경구수액요법 · ESPGHAN 2014 · ACG 급성 설사 지침 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

무엇을 마시고, 무엇을 피할까

탈수를 막는 음료와 설사·탈수를 늘리는 음료

권하는 음료

조금씩 자주, 미지근하게 마십니다.

- 경구수액제 — 설사가 잦거나 어지러울 때 먼저
- 보리차 — 미지근하게
- 쌀뜨물 — 전분이 흡수를 돕습니다
- 맑은 국물 — 멸치·사골, 기름기는 걷어 내고
- 이온음료 — 가벼운 설사 때 소량씩, 심한 탈수에는 부적합

vs

피하는 음료

설사나 탈수를 오히려 늘립니다.

- 커피·술 — 소변으로 물이 빠져 탈수가 심해짐
- 탄산음료 — 당분이 장에 물을 끌어들여 설사 증가
- 과일주스 원액 — 과당이 많아 설사 악화
- 우유 — 일시적으로 소화가 안 돼 설사
- 차가운 음료 — 장 운동을 자극

Tip · 한 번에 벌컥 마시지 말고 몇 모금씩 자주 마시면 토하지 않고 흡수됩니다.

근거 · WHO 경구수액제 조성 · WGO 급성 설사 지침 2012 · 아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

이온음료는 가벼운 설사의 대안으로만 봅니다

정기욱 연자 Q&A · 심한 설사와 탈수를 구분합니다.

고려할 수 있는 상황

- 정기욱 연자는 Q&A에서 가벼운 설사 때 수분·전해질 섭취가 부족하면 이온음료를 대안으로 고려할 수 있다고 답했습니다.
- 소량씩 나누어 자주 마시는 정도로 설명했습니다.
- 이온음료는 설사에 의한 탈수 보충을 목적으로 만든 전해질 조성이 아닙니다.

vs

과음하지 않고 탈수 확인

- 당 함량이 높은 이온음료·과당·탄산음료는 가스와 설사를 악화시킬 수 있어 과도하게 마시지 않습니다.
- 심한 설사나 탈수가 있으면 적절한 전해질 보충과 의료기관 치료가 필요합니다.
- 기존 안내처럼 설사가 잦거나 어지러우면 경구수액제를 먼저 선택합니다.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증상에 따라 네 단계로 식사를 늘립니다

물만 → 미음·죽 → 진밥·반찬 → 평소 식사 — 먹을 것 목록과 단계표는 안내문을 드립니다




그림 · 물 → 미음 → 죽 → 밥상 순서로 한 단계씩 넘어갑니다(설명용 그림).

1 첫날 · 물만 먹을 수 있으면 바로 다음 단계

경구수액제·보리차·쌀뜨물·맑은 국물을 조금씩 자주. 밥은 잠시 쉽니다.

2 회복 초기 · 미음·죽 죽이 괜찮으면 다음 단계

구토가 멎으면 흰쌀 미음·죽·누룽지, 삶은 감자·바나나·두부·삶은 계란.

3 회복기 · 진밥과 반찬 여러 끼 연달아 괜찮으면 다음 단계

진밥 → 일반 밥. 흰살 생선·닭가슴살·된장국·호박죽·익힌 채소.

4 평소 식사 · 다시 보기 증상 사라진 뒤

3~5일 뒤 매운 것·기름진 것 재개. 2주가 지나도 안 좋으면 꼭 다시 진료.

Tip · 설사가 멎어도 장은 아직 회복 중입니다 — 진밥에서 일반 밥까지 2~3일에 걸쳐 바꾸세요.

근거 · ESPGHAN/ESPID 2014 · WGO 급성 설사 지침 2012

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

좋아진 뒤 3~5일까지 피할 음식 여섯 가지

장 점막을 자극하거나 설사를 늘리는 음식입니다

음식	예	왜 피하나
매운 음식	김치찌개·떡볶이·짬뽕·라면	매운 성분이 장을 자극해 통증·설사 악화
기름진 음식	삼겹살·치킨·피자·튀김	손상된 장에서 흡수가 안 돼 설사
우유·치즈	우유·아이스크림·치즈	일시적으로 우유 소화가 안 돼 가스·설사
찬 음식	냉면·빙수·찬 음료	장 운동을 자극해 복통·설사
카페인·술	커피·에너지 음료·술	장 운동 자극, 탈수 악화
단 음식·인스턴트	케이크·과자·즉석식품	당분이 설사를 늘리고 짠맛이 장 자극



그림 · 튀김·술·커피·우유·매운 찌개는 좋아진 뒤 며칠 더 쉽니다 (설명용 그림).

Tip · 빵·면 같은 밀가루 음식과 사과·복숭아 같은 과일도 나은 뒤에 드세요.

근거 · 광교바른내과 장염 식사 안내문 · WGO 급성 설사 지침 2012

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

무엇을 먹느냐만큼, 어떻게 먹느냐도 중요합니다

장에 부담을 줄이는 네 가지 식사 방법

① 조금씩 자주

한 번 양을 줄이고 하루 **5~6번**으로 나눠 드세요.

② 천천히 오래 씹기

한 입에 **30번 이상** 씹으면 위장 부담이 줄어듭니다.

③ 미지근하게

너무 뜨겁거나 차가운 음식은 피하고, 체온과 비슷한 온도(35~40°C)로 드세요.

④ 삶고 찌기

삶기·찌기·데치기 위주로. 튀김·볶음, 고춧가루·후추·생마늘은 줄입니다.



그림 · 작은 숟가락으로, 시간을 두고, 물과 함께 — 위가 편안해집니다(설명용 그림).

Tip · 소금·간장은 조금은 괜찮습니다 — 자극적인 양념만 줄이세요.

근거 · 광교바른내과 장염 식사 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때는 바로 병원으로 — 쓰러질 듯하면 응급실로

단순 장염이 아닐 수 있는 신호입니다 — 한 가지라도 있으면 미루지 마세요

1

심한 탈수

6시간 넘게 소변이 안 나오거나, 입·혀가 바짝 마르고, 어지럽거나 쓰러질 것 같고, 몹시 처집니다. 혈관 주사로 수액이 필요할 수 있습니다.

의식이 흐리거나 실신하면 응급실

2

피가 섞인 변

선홍색 피나 검붉은 변, 피 섞인 점액변은 세균성 장염이나 다른 병일 수 있어 검사·치료가 필요합니다.

오늘 바로 진료

3

열이 날 때

장염에 열이 함께 나면 세균성 장염일 수 있어 다시 진료를 받습니다. 해열은 타이레놀로 합니다.

바로 내원 · 031-893-4560

Tip · 소변이 거의 안 나오거나 정신이 흐려지면 기다리지 말고 응급실로 가세요.

근거 · IDSA 감염성 설사 지침 2017 · 광교바른내과 장염 식사 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

지사제는 설사의 양상에 따라 다릅니다

정기욱 연자 Q&A · 로페라마이드의 사용 조건입니다.

사용을 고려하는 상황

- 정기욱 연자는 Q&A에서 **면역기능이 정상인 성인**의 단순 급성 물설사는 로페라마이드를 사용할 수 있다고 답했습니다.
- 증상 조절을 위한 약이며 수분·전해질 보충이 먼저입니다.

vs

피해야 할 상황

- **고열·혈변·염증성 설사**가 있으면 피하는 것이 좋다고 답했습니다.
- **C. difficile 감염**이 의심되는 등 활동성 감염성 설사에서도 피한다고 답했습니다.
- 해당 양상이 있으면 혼자 지사제를 선택하지 말고 진료받으세요.

아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

예방 목적의 구충제 정기복용이 필요할까요?

김민재 연자 Q&A · 음식 노출과 기생충 종류를 구분합니다.

예전에 쓰던 구충제

- 김민재 연자는 Q&A에서 예전에 주기적으로 먹던 알벤다졸은 회충 같은 장내 기생충에 효과가 있다고 설명했습니다.
- 현재 국내에서는 음식으로 전파되는 간흡충·폐흡충·조충류를 구분해야 한다고 답했습니다.

VS

음식 위생을 챙깁니다

- 김민재 연자는 Q&A에서 **예방 목적으로 구충제를 주기적으로 복용할 필요는 없겠다**고 답했습니다.
- 기생충 예방에는 **음식을 잘 익혀 먹는 것**이 중요하다고 강조했습니다.
- 장염 예방의 기존 손 씻기·충분히 익혀 먹기 수칙을 함께 실천합니다.

아산 28회 연수강좌 — 진료실에서 경험할 수 있는 기생충 질환(김민재)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

대부분 1주 안에 회복됩니다 — 물과 식사만 잘 챙기면 됩니다

01 물·보리차를 조금씩 자주 — 탈수 신호면 경구수액제 먼저

02 구토가 멎으면 미음·죽부터 — 오래 굶지 않기

03 죽만 고집 말고 두부·계란·바나나·흰살 생선도

04 매운 것·기름진 것·찬 것·커피·우유는 잠시 쉬기

05 조금씩 자주, 30번 씹고, 미지근하게

06 우유·요거트 등 유제품은 2~4주 뒤 조금씩

07 손 씻기 30초 · 음식은 75°C 이상 익혀서 예방

08 열·혈변·심한 탈수는 바로 진료, 쓰러질 듯하면 응급실

Tip · 궁금한 점은 진료 때 언제든 물어보세요.

근거 · WHO 설사 치료 지침 · ESPGHAN 2014 · IDSA 2017

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 따라 할 단계별 식단표는 장염 단계별 식사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

급성 장염으로 불편한 분과 가족을 위한 식사 안내자료입니다. 약과 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

WHO 설사 치료 지침 · ESPGHAN/ESPID 2014 · ACG 급성 설사 지침 2016 · WGO 급성 설사 지침 2012 · IDSA 감염성 설사 지침 2017 · 광교바른내과 장염 식사 안내문

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 장염 단계별 식사 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/gastroenteritis-stepwise-diet/