RA 진료의 기초 항체와 약제 선택

RA 치료 기초 복습 — methotrexate와 leflunomide의 선택·안전성

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

RF는 류마티스관절염 자체의 표지가 아니다

Rheumatoid factor의 해석은 임상 맥락에서 출발한다

RF 양성의 의미

RF는 IgG의 Fc 부위에 결합하는 항체이며 보통 IgM을 측정한다. RA뿐 아니라 쇼그렌병·루푸스, 감염과 정상 고령자에서도 양성일 수 있다.

RF 음성의 의미

RA 환자의 20~30%는 RF 음성이다. 양성만으로 RA를 확진하거나 음성만으로 배제할 수 없다. 관절통·관절부종뿐 아니라 눈·입마름 등 동반 증상을 함께 본다.

진단된 RA에서 RF 양성·고역가는 더 심한 관절 염증·파괴 및 관절외 침범과 관련된다고 설명했다.

ACPA는 병인·예측·예후를 연결한다

Anti-CCP antibody의 임상적 역할

병인

환경 요인과 유전적 감수성 아래 citrullination이 일어나고 이에 대한 항체가 형성되는 경로를 설명했다.

진단·발병 예측

RF보다 특이도가 높다. RF 음성 RA에서도 양성일 수 있고, 임상 증상 이전에 검출될 수 있다.

예후

지속성·미란성 경과와 관절외 간질성 폐질환·심혈관질환의 연관성이 소개되었다. 양성 유무와 함께 역가를 본다.

강의 비교표: RF 민감도 70%·특이도 80%, anti-CCP 민감도 75%·특이도 90~95%. 고역가는 정상 상한의 3배 기준.

항체보다 먼저 객관적 활막염을 본다

분류기준은 임상 평가의 출발 조건과 함께 사용한다



검사 전 임상상

적어도 한 관절에 분명한 임상적 활막염(부종)이 있고 다른 질환으로 더 잘 설명되지 않는 환자가 분류기준의 대상이다.

함께 평가할 축

관절 침범, RF/ACPA, ESR·CRP, 증상 지속 기간을 함께 평가한다. 강의는 이를 진단기준과 동일시하지 않도록 설명했다.

연자 Q&A · 의뢰

객관적 관절 부종이 6주 이상 지속되면 RF·anti-CCP와 염증 수치가 정상이더라도 류마티스내과 의뢰가 필요하다고 답했다.

정상 혈액검사가 지속되는 관절 부종의 평가를 미루는 이유가 되지 않는다 — 연자 Q&A.

연자 Q&A: Methotrexate가 먼저인 이유

질문: 왜 leflunomide보다 1차 약제로 우선하는가

효과

연자는 methotrexate가 류마티스관절염의 효과 측면에서 우수하다고 답했다.

부작용과 임상자료

효과·부작용 측면의 평가와 가장 많은 임상 결과를 가진 점을 근거로 표준치료, 즉 1차 약제라고 설명했다.

표준치료(1차약제)

위의 효과·부작용·임상자료를 이유로 methotrexate를 류마티스관절염의 표준치료(1차약제)라고 답했다.

연자 Q&A: 효과·부작용·임상자료의 축에서 MTX의 1차 약제 위치를 설명했다.

연자 Q&A: Leflunomide의 주의점

간수치와 임신 계획을 약제 선택 상담에 연결한다



간수치 상승

연자는 leflunomide의 부작용 측면에서 간수치 상승을 조심해야 한다고 답했다.

임신 절대 금기

임신에서 절대 금기라는 조건을 명확히 제시했다.

추후 임신 고려

가임기 여성이 나중에 임신을 고려할 때 wash out이 필요하다고 답했다. 임신 계획과 치료력을 연결해 상담한다.

이 세 항목은 연자의 Q&A 답변으로 제시한 선택·안전성의 핵심이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 해석과 약제 선택을 연결해 복습

임상상에서 출발하고 Q&A의 약제별 주의점을 기억한다

강의

강의 · RF/ACPA

관절 부종과 임상 맥락에 맞춰 검사를 해석한다. RF 양성은 확진이 아니고 RF 음성은 배제가 아니다. ACPA는 역가·예후 정보를 더한다.

연자 Q&A

연자 Q&A · MTX

가장 많은 임상 결과와 효과·부작용 측면의 우수성이 표준 1차 약제인 이유로 제시되었다.

연자 Q&A

연자 Q&A · Leflunomide

간수치 상승, 임신 절대 금기, 가임기 여성의 추후 임신 시 wash out 필요를 함께 기억한다.

> 관절 부종이 지속되면 혈액검사 결과만 기다리지 않고 진료를 의뢰한다 — 연자 Q&A.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의의 핵심을 진료의 연결점으로

RA 치료 기초 복습 — methotrexate와 leflunomide의 선택·안전성

강의 · RF/ACPA

관절 부종과 임상 맥락에 맞춰 검사를 해석한다. RF 양성은 확진이 아니고 RF 음성은 배제가 아니다. ACPA는 역가·예후 정보를 더한다.

연자 Q&A · MTX

가장 많은 임상 결과와 효과·부작용 측면의 우수성이 표준 1차 약제인 이유로 제시되었다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,

드림타워2 4층 402~404호

031-893-4560

강의 학습자료 다시 보기

관절 부종이 지속되면 혈액검사 결과만 기다리지 않고 진료를 의뢰한다 — 연자 Q&A.