속이 불편하면 식사법부터 조정

오심, 더부룩함, 변비, 설사는 흔하지만 방치하면 탈수와 치료 중단으로 이어질 수 있습니다.
증상별 대응법을 미리 정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가장 흔한 불편감은 위장관에서 옵니다

대부분은 시간이 지나며 줄지만, 심한 증상은 증량 속도와 식사법을 다시 봐야 합니다.

오심

소량씩, 기름기 줄이기, 식사 후 바로 눕지 않기.

변비

수분, 섬유질, 걷기, 필요 시 진료 후 약 조정.

설사

탈수 신호를 보고, 지속되면 진료에 알립니다.



그림 · 위장관 증상 관리 — 위장관과 수분 및 작은 식사 일러스트(설명용 그림).

Tip · 오심·구토·설사·변비는 약 자체뿐 아니라 과식, 기름진 음식, 식사 속도, 수분 부족과 함께 생깁니다. 원인을 나눠 보면 조절할 수 있습니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

양보다 속도가 먼저입니다

빨리 먹으면 포만감이 늦게 따라와 과식하고, 이후 더부룩함이 오래 갑니다.



먼저 기억할 점

한 번에 많이 먹기보다 작은 양을 천천히 먹습니다. 속이 불편한 날은 담백한 단백질과 부드러운 채소부터 시작합니다.

소량

평소의 1/2–2/3부터 시작해 불편감에 맞춥니다.

천천히

15–20분 이상, 한 입마다 잠깐 멈춥니다.

담백하게

튀김·크림·매운 음식·야식은 증상이 안정될 때까지 줄입니다.

Tip · 한 번에 많이 먹기보다 작은 양을 천천히 먹습니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 광교바른내과 진료 안내(식사 분량·속도 예시)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

변비는 물·섬유질·활동량이 같이 움직입니다

식사량이 줄면 대변량도 줄어 변비가 더 잘 생깁니다.



그림 · 걷기와 수분 — 수분과 섬유질과 가벼운 걷기 일러스트(설명용 그림).

살펴볼 것	실천 방법
수분	소변 색이 진하고 어지러우면 부족 신호일 수 있습니다.
섬유질	채소·해조류·콩류를 천천히 늘립니다.
활동	식후 10분 걷기는 장운동에도 도움이 됩니다.

Tip · 변비 대처는 한 가지가 아니라 조합입니다. 물만 마시고 움직이지 않거나, 섬유질만 늘리고 물이 부족하면 더 불편할 수 있습니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침(걷기)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이번 회차는 작게, 천천히, 촉촉하게

이번 주는 증상 일지를 쓰고, 수분과 식사 속도를 먼저 조절합니다 · 집에서 볼 1장 요약: **시작 안내문**

이번 회차 핵심

01 오심·변비는 흔하지만 조절 가능한 신호입니다.

02 작게 먹고 천천히 먹는 것이 첫 번째 처방입니다.

03 수분·섬유질·걷기는 변비 관리의 세트입니다.

04 증상이 심하면 7회차 위험 신호 기준대로 바로 연락합니다.

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내