
MASLD 의심·간효소 이상: 일차진료 선택검사와 의뢰

지방간이 보여도 다른 원인과 동반 질환을 함께 평가합니다.

이상 소견에 따라 검사 경로 선택



ANA 양성·IgG 상승은 자가면역간염 확진과 같지 않습니다.

강의 증례에서 보인 감별 과정

검사·소견	과정과 결과
65세 남성 · 당뇨·고혈압·이상지질혈증	AST/ALT 132/242 IU/L, GGT 120 IU/L. ANA 1:80, IgG 1785 mg/dL.
초음파·탄성도	중등도 지방간, LSM 9.8 kPa, CAP 321 dB/m. ANA·IgG 상승으로 조직검사.
결과	지방간염 grade 2, stage 3. 연자 Q&A: 동반 자가면역간염의 증거는 없었음.

ANA·IgG 검사 범위 — 연자 Q&A 의견

진료 환경	연자 설명
연자 3차병원	간기능검사 이상에서 ANA·IgG를 일상 선별검사로 시행.
일차 의료기관	자가면역간염 유병률이 낮아 일반적으로 선별검사에 포함할 필요는 없다고 답변. 단계적 평가·의뢰를 권고.

체중 관리 · 연자 Q&A 의견

정상체중 지방간은 약 3–5% 감량이 도움됩니다. 저체중에는 감량을 권하지 않고 내장지방·근육량, 근력운동, 정제 탄수화물·과당 줄이기에 초점을 둡니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

MASLD 의심·간효소 이상: 일차진료 선택검사와 의뢰

상세 확인 · 질환별 적용과 안전성

연자가 시행하는 초진 검사 — 3차병원 맥락

범주	연자 Q&A에서 열거한 검사
기본·대사	Routine lab, HbA1c, insulin.
간염·면역	HBsAg, anti-HBs, IgG anti-HBc, anti-HCV, IgG anti-HAV, ANA titer, IgG.
기타·영상	AFP, TSH, free T4, ceruloplasmin, 복부 초음파, Fibroscan.

일차진료에 그대로 일괄 적용하지 않기

위 목록은 연자가 3차병원에서 시행하는 검사입니다. 일차진료에서는 FIB-4·Fibroscan을 이용한 단계적 접근으로 의뢰하라는 답변입니다.

GGT 단독 상승 — 연자 Q&A 의견

원인 범주	제시된 예
흔한 원인	음주·지방간.
그 외	침윤성 질환(간결핵·전이 등), 췌장염, 심근경색, 전립선암.
약제	Carbamazepine, cimetidine, furosemide, heparin, methotrexate, 경구피임약, valproic acid.

음주량 문진 — 연자 Q&A의 환산 예

알코올	대략적인 음료량
30 g	소주 약 4.5잔 / 맥주 750 mL / 막걸리 600 mL.
여성 기준 20 g	소주 3잔 / 맥주 500 mL 1캔.

간장약 해석 — 연자 Q&A 의견

UDCA·silymarin은 임상 사건 개선 효과가 대규모 시험에서 입증된 것은 아니나 현실적으로 처방한다고 답변했습니다. DDB 함유 제제는 ALT를 낮춰 감별에 혼란을 줄 수 있어 초기 조합으로 UDCA+silymarin을 사용한다는 경험을 설명했습니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-masld-selective-testing/