임신 중 간효소 상승: MASLD로 단정하지 않기

임신부 ALT 180 사례에 대한 연자 Q&A 의견을 진료 흐름으로 정리했습니다.

ALT 180: 진단을 다시 나누는 출발점



ALT 180을 단순 MASLD로 단정하지 말고 다른 원인을 배제해야 한다는 답변입니다.

ALT 180 사례 — 연자 Q&A 의견

현재 판단	감별할 원인
단순 MASLD로 단정하지 않기	자가면역간염, 바이러스간염, 임신 시기별 간질환을 배제합니다.

임신 중 MASLD 치료약에 대한 답변

구분	연자 Q&A 의견
GLP-1 계열	금기.
Pioglitazone · SGLT2 억제제	권장하지 않음.
Resmetirom · 비타민 E · 스타틴	모두 권장하지 않음.

연자 Q&A 결론

MASLD 자체를 치료하기 위해 임신 중 사용할 수 있는 약은 없다고 답변했습니다. 임신 중 간효소 이상은 다른 원인 감별과 함께 접근합니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-pregnancy-liver-enzymes/