
# 체중·숨참·붓기를 함께 기록하세요

심부전은 심장에 피가 차고 나가는 기능이나 구조의 문제로 숨참과 부종 등이 생기는 상태입니다.

## 숨참과 붓기는 몸에 물이 차는 변화와 연결됩니다




체중 변화와 숨참·붓기를 나란히 기록합니다

폐에 물이 차면 숨이 차고, 전신에 물이 차면 다리가 붓는 변화가 나타날 수 있습니다.

## 다음 진료에 가져갈 기록

1. 체중: 날짜와 체중을 적습니다. 퇴원할 때 안내받은 목표 체중 범위를 함께 적어 둡니다.
2. 숨참: 활동할 때의 숨참, 누웠을 때 숨이 더 차는지 적습니다.
3. 붓기: 다리 붓기와 그 변화를 적습니다. 체중 변화와 나란히 보면 진료에 도움이 됩니다.

## 체중 기록지

| | |
|---|---|
| 날짜 · 체중 | _____ |
| 숨참 · 누울 때 변화 | _____ |
| 다리 붓기 · 복용한 약 | _____ |
| 안내받은 목표 체중 | _____ ~ _____ kg |

## 약 조절 계획도 함께 가져오세요

퇴원 뒤 이뇨제 용량은 체중 변화, 울혈과 증상을 보고 정합니다. 연자 Q&A에서는 퇴원할 때 개인별 목표 체중과 약 조절 범위를 교육한다고 설명했습니다. 진료실에서 받은 내 계획과 기록을 함께 준비하세요.

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

# 기록을 보고 치료를 맞춥니다

체중만 줄이는 것이 치료의 전부는 아닙니다. 증상과 신장 기능, 전해질 검사도 함께 살핍니다.

## 물의 변화와 약의 효과를 함께 봅니다

### 울혈을 줄이는 이뇨제

몸에 물이 차서 숨이 찬 경우에는 이뇨제가 증상 개선에 도움이 됩니다. 울혈이 나아져도 숨참이 그대로라면 다른 원인도 살핍니다.

### 체중이 너무 줄고 힘이 없다면

약을 쓰는 동안 체중이 많이 줄고 혈압이 떨어지며 힘이 없는 변화가 생기면, 함께 쓰는 이뇨제를 포함해 치료를 다시 조정하는 자료가 됩니다.

## 퇴원 뒤 추적 진료에서 보는 것

| | |
|---|---|
| **시기** | 연자 Q&A에서는 첫 외래를 퇴원 후 2주 안팎으로 잡아 약이 과하거나 부족하지 않은지 살핀다고 설명했습니다. 개인 예약일에 맞춰 방문합니다. |
| **기록** | 체중 변화, 숨참과 붓기, 실제 복용한 이뇨제 양을 가져옵니다. |
| **혈액검사** | 전해질, 요소질소(BUN), 크레아티닌(Cr), NT-proBNP 등을 함께 보고 용량을 정합니다. |

## 내 진료 계획을 적어 두세요

1. 다음 진료일: _____
2. 목표 체중과 약 조절 안내: _____
3. 현재 복용약과 달라진 증상: _____

## 같은 숨참이라도 원인은 다를 수 있습니다

심장 기능이나 구조의 이상이 있는지, 그 이상이 폐와 전신에 물이 차는 현상과 증상을 설명하는지 함께 보아야 합니다. 체중·숨참·붓기를 같이 기록하는 이유입니다.

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진


다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/cardio/asl28-heart-failure-home-record/