아기를 만나는 가족의 백일해 예방접종

아기가 태어난 집이나 아기를 보러 가는 가족이 **Tdap(백일해 예방 백신)**을 맞으러 오시는 경우가 많습니다. 누가 맞아야 하는지, 이미 맞았다면 다시 맞아야 하는지, 임신부는 어떻게 하는지 정리했습니다.

나이와 관계없이 권하는 접종입니다



Tdap은 위팔에 맞는 주사 1회입니다

연수강좌 질의응답 · 연자의 답변

아기가 태어난 집이나 아기를 보러 가는 경우 **20~40대 성인에게도 백일해 예방을 위한 Tdap 접종을 권할지** 묻는 질문에 연자는 이렇게 답했습니다. **"연령과 관계없이 추천되는 접종입니다."**

Tdap 접종 기록이 없으면 1회 접종이 추천됩니다. Tdap은 백일해 예방이 주목적이지만 **파상풍 백신도 함께** 들어 있습니다.

나는 어디에 해당할까요 — 상황별 안내

나의 상황	연자의 답변 요약
● **Tdap 접종 기록이 없다**	**1회 접종**을 권합니다. 연령은 묻지 않습니다.
● **10년 이내에 Tdap을 맞았다** (예: 부스트릭스를 1회 맞은 기록)	백일해 예방을 위해 **다시 맞을 필요가 없습니다.** 손주·조카가 또 태어나도 마지막 접종이 10년 이내라면 반복하지 않습니다.
● **임신 중이다**	임신부는 **임신할 때마다 따로** 접종이 필요합니다.

⚠ 필요한 만큼만 맞는 이유 — 접종 전에 꼭 알려 주세요

Tdap에는 파상풍 백신이 들어 있어, **이미 파상풍 항체가 있는 상태에서 다시 맞으면** 드물게 항원-항체 반응으로 **접종 부위 근처가 심하게 붓는 반응(Arthus 반응)**이 생길 수 있습니다. 그래서 꼭 필요한 만큼만 접종하는 것이 바람직합니다. **이전에 이런 반응을 겪은 적이 있다면 접종 금기**에 해당하니, 임신부도 포함해 접종 전에 미리 말씀해 주세요.

상처가 났을 때 — 파상풍 주사

- 연자는 **물린 상처를 오염된 상처**로 봅니다.
- 기본 접종 기록이 불확실하거나 **3회 미만**이면 **Tdap과 파상풍 면역글로불린(TIG)**을 함께 맞는 것이 적절하다고 답했습니다.
- 둘 다 필요하면 **같은 날 서로 다른 부위**에 맞고, 면역글로불린이 백신 효과를 방해하지 않습니다.

접종 시기가 늦어졌다면

- 백신 간격이 길어져도 **처음부터 다시 시작하지 않습니다.** 이미 만들어진 면역기억이 사라지지 않기 때문입니다.
- 이전 접종을 인정하고 **남은 횟수만 이어서** 맞습니다. 몇 년 늦어도 같습니다.
- 예외는 경구(먹는) 장티푸스 백신과 조혈모세포이식 뒤 재접종입니다.

내 접종 기록이 정확히 기억나지 않거나 궁금한 점이 있으면 진료 때 물어보세요. 기록을 보고 필요한 접종을 함께 정해 드립니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

출처 · 아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호) — 연수강좌 질의응답 116~117쪽의 연자 답변

본 자료는 일반 안내입니다. 접종 여부와 시기는 접종 기록과 건강 상태를 보고 진료실에서 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/vaccine/asl28-pertussis-family-newborn/