요충 치료, 약을 오래 먹기보다 가족이 함께 관리하세요

엉덩이(항문) 가려움으로 소아과 등을 찾는 경우의 대표적인 원인이 요충입니다. 요충은 **오래 먹는 것보다 간격을 두고 반복하고, 가족이 함께 치료하는 것**이 중요합니다.

요충은 이렇게 항문을 가렵게 합니다



맹장 주변에 살다가 암컷이 항문으로 내려와 알을 낳습니다

요충의 생활

성충은 대장이 시작되는 **맹장(cecum) 주변에서 기생**합니다. **암컷이 항문으로 이동해 충란(알)을 내놓기** 때문에 항문에 충란이 많이 묻고, 그 자극으로 **항문이 가렵습니다.**

요충은 한국에 아직 있습니다. 2008~2019년 유치원생 조사(체계적으로 짠 조사는 아님)에서 충란 양성은 **약 1~2%(2% 미만)**였고, 제주뿐 아니라 서울도 적지 않았습니다.

숫자로 보는 요충

암컷 성충	수컷 성충	충란(알) 크기	감염력이 생기기까지
8~13 mm (약 1cm)	**2~5** mm	**50~60** μm · 감씨 모양	**6시간** 몸 밖에 나온 뒤

왜 가족이 함께 치료할까요

	회충 · 편충 · 구충	요충
몸 밖에 나온 뒤	환경에서 시간이 지나야 성숙해 **먹으면 감염되는 형태**가 됩니다.	**6시간만 지나면** 사람에게 감염되는 형태가 됩니다.
그래서	환경 속 충란이 주된 감염원입니다.	자기가 배출한 충란에 **스스로 다시 감염(자가감염)**되기 쉽고, **가족 모두 감염된 경우가 많습니다.**

치료 — 가족이 함께, 반복해서

1. **알벤다졸 400mg을 1회** 복용합니다. 가족도 함께 치료합니다.
2. **2~3주 간격**으로 다시 복용합니다.
3. 이렇게 **모두 2~3회 반복**합니다.

약을 오래 먹기보다 반복이 중요합니다

- 기생충은 **유충 단계에서 구충제 효과가 떨어집니다.**
- 그래서 한 달씩 오래 치료하기보다 **간격을 두고 반복 치료**하는 것이 요충의 특징입니다.
- 치료 뒤에도 가려움이 바로 가라앉지 않는 경우가 있습니다. 다시 치료할지는 **진료에서 함께 상의**합니다.

가려움이 계속되거나 약을 먹었는데도 좋아지지 않으면 진료 때 물어보세요. 가족 중 함께 가려운 분이 있는지도 알려 주시면 치료 범위를 정하는 데 도움이 됩니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

출처 · 아산 28회 연수강좌 — 진료실에서 경험할 수 있는 기생충 질환(김민재)

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 종류·용량·반복 횟수와 가족 치료 범위는 진료실에서 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/infectious/asl28-pinworm-family-care/