혈압·혈당을 낮추는 운동 처방 — 식후 15분, 버티기 운동

운동은 양보다 배치가 중요합니다. 몰아서 하는 운동보다 짧게 자주 하는 운동이 혈당이 튀는 것을 억제하고, 이완기 혈압이 높다면 버티는 운동(등척성 운동)을 더합니다.

먼저, 이 네 가지만 기억하세요

항목	처방	왜 · 어떻게
유산소 운동	**30분×주5회**	몰아서 하는 주말 3시간보다 낫습니다
식후 걷기	**15분×3번**	저녁 한 번 1시간보다 낫습니다
버티기 운동 강도(악력기)	**최대 악력 30%**	2분 버티고 1분 쉬기
근력운동 순서	**하체부터**	큰 근육을 먼저 움직입니다

나눠서, 자주 — 언제 어떻게 움직일지



식사 후 바로 앉지 말고 15분 걷기

몰아서 하지 말고 나눠서 · FREQUENCY

- **1. 주말 3시간보다 30분씩 주 5회**가 낫습니다
- **2. 매일 몸을 움직이는 습관**이 핵심입니다

식후엔 짧게, 여러 번 · TIMING

- **1. 저녁 한 번 1시간보다 식후 15분씩 3번**이 낫습니다
- **2. 식사 후 바로 앉지 말고** 짧게라도 걸어 보세요

운동 종류별로 혈압이 얼마나 떨어질까요

운동 종류	수축기 ↓ mmHg	이완기 ↓ mmHg	이럴 때 특히
유산소 운동 걷기·달리기·자전거	**4.49**	**2.53**	기본 운동 — 혈압이 이미 높은 분에서 더 크게 떨어졌습니다
근력 운동(동적) 기구·밴드 근력운동	**4.55**	**3.04**	고혈압 전 단계(경계 혈압)에서 효과가 가장 컸습니다
복합 운동 유산소+근력	**6.04**	**2.54**	수축기 혈압을 더 낮추고 싶을 때 — 등척성 다음으로 효과 순위가 높았습니다
고강도 인터벌 짧고 강하게 반복	**4.08**	**2.50**	짧고 강하게 하는 방식 — 효과는 유산소와 비슷했습니다
등척성 운동(버티기) 악력기·벽 스쿼트	**8.24**	**4.00**	이완기 혈압이 높을 때 — 세부 운동 중 벽 스쿼트가 수축기 강하 1위였습니다

이완기 혈압이 높다면: 등척성 운동은 이완기 혈압이 평균 4.00mmHg 떨어져, 유산소·인터벌·복합 운동(2.50~2.54)보다 약 1.5mmHg, 근력 운동(3.04)보다 약 1.0mmHg 더 떨어졌습니다.

평균값이며 사람마다 다릅니다. 운동하지 않은 대조군과 비교해 안정 시 혈압이 평균 얼마나 내려갔는지입니다(2주 이상 운동한 무작위 대조시험 270개·15,827명).
근거 — Edwards JJ 외, Br J Sports Med 2023 (네트워크 메타분석) · Cornelissen VA·Smart NA, J Am Heart Assoc 2013 (메타분석).

이완기 혈압이 높다면 — 버티기 운동(등척성 운동)

버티기 운동 처방	방법 · ISOMETRIC HOLD
1. 악력기	최대 악력의 30%로 2분 쥐고, 1분 쉬기를 4회. 사무실에서도 짧게 할 수 있습니다.
2. 벽 스쿼트·플랭크	악력기처럼 측정하기 어려우니, 힘들지만 계속할 수 있는 강도로 2분 버티고 1분 쉬기를 4회 하되 무리하면 시간을 줄이세요.
3. 주의	유산소 운동에 더하는 보조 운동이며, **혈압이 아직 조절되지 않았다면 시작 전 담당 의료진과 상의하세요.**

걸음 수보다 강도, 다치지 않게

걸음 수보다 강도 · INTENSITY	다치지 않게 · SAFETY
1. 걸음 수만으로는 운동량을 판단하기 어렵습니다. 산책은 활동이고, 운동은 숨이 찰 정도의 강도가 필요합니다	**1. 다치면 운동을 아예 못 하게 됩니다** — 무게보다 횟수를 먼저, 그다음 세트를 늘려 보세요 **2. 관절이 아프면 쉬세요**

흔한 오해 바로잡기 · MYTH

흔한 오해	사실
"7~8천 보 걸으니 충분하다"	걸음 수만으로는 부족합니다. 강도와 근력운동이 함께 필요합니다.
"살이 빠져야 운동할 수 있다"	지금 체중에서 시작해도 혈압·혈당이 좋아질 수 있습니다.

운동 중 이럴 땐 바로 멈추세요

운동 중 **가슴 통증·심한 호흡곤란·실신감**이 있으면 즉시 멈추고 응급실로 가시거나 119에 연락하세요. 가벼운 어지럼에도 즉시 운동을 멈추고 쉬시고, 반복되면 진료받으세요.

노쇠·낙상 위험 또는 뇌동맥류가 있으면 기능·영양·병변 위험도와 혈압을 평가해 운동을 조정합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침 (2025) 운동요법 · 아산 28회 연수강좌(정창희·백지연·박중철)

본 자료는 일반적인 운동 원칙을 안내하며, 개인별 운동 강도·종류와 동반질환에 따른 주의사항은 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/exercise-bp-glucose/