장염·배탈 때 이렇게 드세요

단계식 식사 — 장염은 대부분 며칠 안에 좋아집니다. 식사는 한 칸씩, 물은 꾸준히.

식사는 한 칸씩, 물은 꾸준히



물 → 죽 → 흰쌀밥 → 양 늘리기

수분 보충

수분은 **물·보리차**로 채웁니다. 한 번에 많이보다 **조금씩 자주** 드세요.

설사가 잦거나 어지러우면 약국의 **경구수액제**가 물보다 낫습니다. 이온음료는 **물과 1:1로 타서** 마셔도 됩니다.

수액은 부족한 수분을 채우는 **보조 치료**입니다 — 마실 수 있으면 입으로 먼저, 구토·설사로 못 드시거나 탈수가 오면 수액이 도움이 됩니다.

식사는 한 칸씩 올립니다 — 너무 빨리 올리면 다시 탈이 날 수 있습니다

단계	이렇게 드세요	다음 칸으로 가는 때
1 · 물 먼저	토하거나 속이 불편하면 **물·보리차를 조금씩 자주** 마십니다. 끼니를 오래 거르지는 않습니다.	먹을 수 있게 되면 바로 — 적은 양부터
2 · 죽	**죽·누룽지**를 적은 양부터 시작합니다.	죽이 괜찮으면
3 · 흰쌀밥	**흰쌀밥**에 아래 표의 부드러운 반찬을 곁들입니다.	여러 끼 연달아 괜찮으면
4 · 양 늘리기	그때 **양을 늘립니다**. 좋아진 느낌은 문턱 아래로 내려왔을 뿐 — 장은 아직 회복 중입니다.	좋아진 뒤에도 조금 더 조심하며 천천히

먹어도 되는 것 · 잠시 피할 것

구분	먹어도 됩니다	당분간 피하세요
밥·곡류	죽·누룽지·흰쌀밥	**잡곡**, **밀가루 음식**(빵·면·국수)
반찬·채소	감자·두부, 익힌 호박·가지·당근	샐러드·생야채 · 양배추(가스가 차고 더부룩할 수 있음)
과일	바나나	사과·복숭아 같은 과일
그 밖	담백하게 조리한 음식	**유제품**(우유 등), **기름진 고기**, **술**

잡곡·야채·과일은 평소엔 좋지만 장염 때는 설사를 늘릴 수 있습니다 — 나은 뒤에 드세요. 장염 식사의 원리와 경구수액제 설명은 진료실 **「급성장염 식이관리」 설명자료**에 있습니다 — edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/acute-gastroenteritis-diet/

이럴 때는 다시 진료를 받으세요

열이 날 때 · **피가 섞인 변(혈변)**을 볼 때 · 배의 한 곳이 계속 아플 때 · **구토**가 계속될 때 · 소변이 크게 줄거나 일어설 때 어지러울 때(**탈수**) · 좋아지지 않고 점점 나빠질 때. 해열은 타이레놀(아세트아미노펜)로 하세요. 소염진통제는 위장에 부담이 됩니다.

소변이 거의 안 나오거나 의식이 흐려지면 — 응급실로 가세요.

지사제를 쓰기 전 확인 — 고열·혈변·염증성 설사 또는 C. difficile 감염이 의심되는 상황에서는 피하는 것이 좋다고 답했습니다. 이런 신호가 있으면 약을 추가하기 전에 진료를 받습니다. (아산28 · 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱))

치료 전에 어떤 항암제를 사용 중인지 확인합니다. 면역관문억제제(ICI) 사용 중 지속 설사·혈변은 면역매개 대장염을 의심해 즉시 의뢰할 상황입니다. (아산28 · 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호))

당이 높은 이온음료나 과당·탄산음료는 복부팽만·설사를 악화시킬 수 있습니다. 이온음료의 전해질 조성은 설사 탈수 보충을 위해 만든 것과 다릅니다. (아산28 · 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱))

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — IDSA 감염성 설사 진료지침 2017 · WGO 급성 설사 지침 2012

본 자료는 장염·배탈 때의 식사를 안내하기 위한 일반 자료입니다. 나이, 임신 여부, 면역상태, 복용 중인 약, 기저질환에 따라 식사와 진료 시점이 달라질 수 있으니 진료 시 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/gastroenteritis-stepwise-diet/