역류성 식도염 생활습관 관리

약과 함께 실천하는 교정입니다. 약은 위산을 줄이고, 생활습관은 역류가 잘 일어나는 조건 자체를 줄입니다.

왜 가슴이 쓰리고 신물이 오르나요?

위와 식도 사이의 조임쇠(**하부식도괄약근**)가 느슨해지고 아래 조건이 겹치면 위산이 올라와 **가슴쓰림·신물**이 생깁니다.

조임쇠 이완	배 안 압력 상승	위가 늦게 비워짐
눕는 자세·과식·흡연이 조임쇠를 느슨하게 합니다.	복부 비만·꽉 끼는 옷으로 배 안 압력이 높아지면 위 내용물이 위로 밀립니다.	기름진 음식·과식으로 위가 늦게 비워질수록 역류할 시간이 길어집니다.

근거가 가장 확실한 두 가지 — 먼저 이것부터

무엇을	어떻게	왜 도움이 되나
① 체중 감량	과체중·복부비만이라면 **체중을 줄이는 것**이 가장 우선입니다. 무리한 단기 감량보다 꾸준히 줄여 유지하는 쪽이 낫고, 목표는 진료에서 함께 정합니다.	배 안 압력이 낮아져 역류 자체가 줄어듭니다. 생활습관 가운데 가장 강하게 권고됩니다.
② 잠들기 전 공복	잠들기 **4시간 전부터는 먹지 않기.** 자정에 잔다면 저녁은 20시(8시) 전에. 늦게 먹었다면 가볍게·조금만 먹고 상체를 높여 잡니다.	누우면 중력의 도움이 없어 역류가 쉬워집니다. 위가 비워진 뒤 누우면 밤 증상이 줄어듭니다.

생활습관 교정은 약을 대신하지 않습니다. 좋아져도 처방약을 임의로 끊거나 줄이지 말고 진료 때 상의하세요.

밤에 증상이 있을 때



베개만 겹치지 말고 상체 전체를 비스듬히

이렇게 하세요	피하세요
• 침대 머리 쪽을 **15~20cm** 올리거나 경사형 쿠션으로 **상체 전체를 비스듬히** • 식사 후에는 **상체를 세우고** 가볍게 움직이기 • 왼쪽으로 누워 자면 밤사이 역류가 줄었다는 보고가 있습니다	• **베개만 겹쳐 베기** — 목만 꺾이고 배가 눌려 역류가 늘 수 있습니다 • 식사 직후 **바로 눕기**

권하는 습관	피하는 것이 좋은 습관
규칙적인 식사 · 한 번에 많이보다 소량씩 나눠 천천히	과식 · 급하게 먹기 · 늦은 밤 야식 · 자기 직전 음주
적정 체중 유지(특히 뱃살) · 흡연 중이라면 **금연**	배를 조이는 옷·복대 · 식사 직후 몸 굽히는 운동 · 흡연(조임쇠를 느슨하게 함)
증상을 일으키는 음식은 **본인에게 맞춰 확인한 뒤 제한**	본인에게 증상을 일으키는 카페인·탄산·기름진 음식·밀가루(빵·면)

음식은 사람마다 다릅니다. 일괄로 다 끊지 말고, 먹은 것과 증상을 **증상일기**에 적어 오시면 문제 음식만 골라 제한합니다.

바로 응급실로(필요하면 119)	생활습관만으로 미루지 말고 진료받으세요
피를 토하거나 검은 변을 볼 때(출혈 가능성) **쥐어짜는 가슴 통증**에 식은땀, 팔·턱으로 뻗치는 통증, 숨참이 함께 있을 때 — 역류로 넘기지 마세요	삼키기 힘들거나 걸리는 느낌 · 의도하지 않은 체중 감소 · 빈혈 · 약을 써도 증상이 계속됨 · 50세 이상에서 처음 생긴 증상

진단·약 치료까지 자세히 보려면 진료실 설명 슬라이드 edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/gerd/lifestyle/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기기능성질환·운동학회 2020 서울 진료지침 · 미국소화기학회(ACG) 위식도역류질환 진료지침 2022

본 자료는 일반 건강정보이며 개인별 진단·처방을 대신하지 않습니다. 증상·동반질환에 따라 권고가 달라질 수 있으니 진료 상담 후 결정하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gerd-lifestyle-2026/