녹내장 환자 내시경 전처치와 안과 연결

진경제 투여 판단과 투여 후 눈 증상을 함께 기록

약물과 급성 폐쇄각의 연결

항콜린 작용 등
동공 산대 또는
모양체·수정체 전방 이동

↓

전방각·방수 유출로 폐쇄
안압의 급격한 상승

↓

안통 · 시력 저하
갑작스러운 증상 →
즉시 안과 진료

전처치 문진 · 약제 기록

☐ 녹내장 진단·현재 점안제·안과 치료 병력: _____

☐ 환자가 알고 있는 유형과 최근 안과 진료 내용: _____

☐ 예정 진경제·실제 투여량·투여 시각: _____

다른 약도 함께 살핍니다

⚠아드레날린성·항콜린성·콜린성 약제, topiramate, 삼환·사환계 항우울제, sulfa 계열도 약제 유발 폐쇄각 관련 약물로 소개되었습니다.

진경제 선택에 관한 성경림 연자 Q&A

질문 약제·상황	연자의 답변
Scopolamine(히스판) · cimetropium(알피트)	병력 청취만으로 개방각·폐쇄각 구분은 어렵고, 필요하면 사용하며 급성 안통·시력 저하 시 즉시 안과 진료 안내
히스판이 꼭 필요해 감량 투여를 묻는 질문	필요하면 감량 투여해도 된다고 답함
Cimetropium · tiropramide / 알피트 반용량 질문	사용 가능하다고 답함

Q&A를 적용할 때

위 답변은 **성경림 연자의 Q&A 의견**입니다. 반 용량의 일률적 안전 기준이나 녹내장 유형을 대신 판정하는 기준으로 쓰지 않습니다.

투여 후 증상과 안과 연결

증상	연결·기록
갑작스러운 안통·시력 저하	**즉시 안과 진료** 안내·연결 시각 기록
두통·구토를 동반한 눈 증상	급성 폐쇄각 녹내장 감별. 강의 증례에서는 뇌 영상 정상 후 안압 **60 mmHg**로 확인

☐ 설명 시행 ☐ · 증상 발생 여부 _____ · 연결 안과/시각 _____

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560

자료 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/glaucoma-endoscopy-antispasmodic-card/