위고비·마운자로를 시작하는 분께

이 주사는 **살을 빼 주는 주사가 아니라, 배부름을 오래 유지하는 주사**입니다.
위에서 음식이 내려가는 속도를 늦춰 포만감이 오래 갑니다.
그러니 **배부르면 바로 수저를 내려놓으세요.**
식사 조절·운동과 함께할 때 효과가 확인됐습니다.

한눈에 보는 치료 방법

주사 간격	용량 올리는 간격	한 달 감량 목표
주 1회	**4주**	**2~5 kg**
배부름을 오래 유지하는 주사	4주 간격으로 저용량부터 한 단계씩 올립니다(허가된 유지용량: 마운자로 5 mg 이상, 위고비 목표 2.4 mg). 부작용이 있거나 감량·식욕 억제 효과가 충분하면 더 올리지 않고 멈추거나 그 용량을 유지할 수 있으며, 진료에서 함께 정합니다.	체중과 건강 상태에 따라 조절합니다

저용량을 사용하는 첫 달에 만들 세 가지 습관



의자 잡고 까치발 들기 · 의자 스쿼트

습관	이렇게 하세요
식사 **단백질·채소는 그대로**	**줄일 것은 빵·면·과자·음료**입니다. 배부른데 억지로 다 먹으면 메스꺼움이 심해집니다.
근력운동 **하체·까치발 운동**	빨리 체중이 빠지면 **근육이 빠지고 기초대사량(쉬고 있을 때 쓰는 에너지)이 떨어집니다.** 첫 달에 근력운동을 습관으로 만드세요.
속도 **천천히 빼야 요요가 줄어듭니다**	**첫 달은 물이 빠집니다.** 숫자에 조급해하지 말고, 목표 속도는 진료 때 함께 정합니다.

흔한 오해 vs 실제

자주 듣는 오해	실제로는
"주사만 맞으면 빠진다"	효과는 **식사 조절·운동을 함께** 했을 때 확인됐습니다
"용량을 올려야 효과가 난다"	부작용이 없고 잘 빠지면 **저용량을 유지**해도 됩니다
"살만 빼고 약을 끊으면 요요는 없다"	약을 끊으면 **어느 정도 요요가 올 수 있습니다.** 요요의 크기는 근력운동으로 근손실을 얼마나 줄였는지, 식습관·생활습관을 실제로 바꿔 약을 끊은 뒤에도 유지하는지에 따라 달라집니다
"예전에 맞아 봤으니 단계를 건너뛰어도 된다"	쉬었다가 다시 시작하면 **대개 낮은 단계부터** 다시 올립니다
"피가 보여야 약이 잘 들어간 것"	피하주사라 **피가 날 필요가 없습니다.** 출혈과 약효는 무관합니다

이럴 땐 꼭 알려 주세요

증상·상황	알아 둘 것·할 일
어지럼·혈압 저하	**마운자로는 혈압을 특히 많이 낮춥니다.** 위고비도 약간(임상시험에서 위약 대비 수축기 약 4 mmHg 안팎) 낮출 수 있습니다. **혈압약 조정**이 필요할 수 있습니다.
탈모	체중이 빠르게 줄 때 휴지기 탈모(머리카락이 한꺼번에 쉬는 시기로 들어가 빠지는 것)가 생길 수 있으며, 체중이 안정되면 **대개 회복되는(가역적) 탈모**입니다. 감량 중에는 **단백질 등 영양소가 부족하지 않도록** 충분히 드세요.
내시경·수술 전	**스스로 주사를 건너뛰거나 끊지 마세요.** 날짜가 잡히면 **약 이름과 마지막 주사일**을 먼저 알려 주세요. 주사 일정과 전날 식사는 「위고비·마운자로 사용 환자 — 검사 전 안전 안내」를 따릅니다.

열이 나거나 계속되는 복통
열이 나거나 복통이 계속되면 **췌장·담낭**을 확인해야 합니다. 멈추지 않는 심한 복통이면(구토가 있든 없든, 등으로 퍼지든 아니든) **다음 주사를 맞지 말고 바로 병원에 연락**하세요. 진료 시간이 아니거나, 통증이 심해 참기 어렵거나, 열·구토가 함께 있으면 **응급실**로 가세요.

진료실 8회 설명 자료(1회차부터): edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/glp1-weight-management/week-01-start/
식후 오른쪽 윗배 통증·발열·황달이 생기면 바로 진료를 받도록 안내했습니다. (아산28 · 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희))
목표 달성·지속 감량 중이면 현재 최저 유효 용량을 유지할 수 있고, 유지 용량 12주 뒤 감량 <5%면 치료 방향을 다시 평가합니다.
저항성 운동·단백질 섭취와 체성분 절대량 추적을 함께 합니다. (아산28 · 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희))
이우형 연자는 급격한 체중 감소와 담낭 운동 저하가 담석 형성에 관여한다고 설명했습니다. 기존 담석이 있다면 시작 전에 알려 주세요.
(아산28 · 무증상 담낭질환, 언제 수술할 것인가?(이우형))

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — STEP-1 (NEJM 2021) · SURMOUNT-1 (NEJM 2022) · SURMOUNT-1~4 위장관 분석 (Diabetes Obes Metab 2025) · SURMOUNT-1 혈압 분석 (Heart 2024) · GLP-1 시술 전후 다학회 권고 2024 · 대한비만학회 비만 진료지침 2024 · 위고비·마운자로 국내 허가사항·환자용 사용설명서

본 자료는 위고비·마운자로를 처음 시작하는 분을 위한 일반 안내이며, 용량과 속도는 개인의 상태에 따라 진료에서 정합니다. 약가·보험 적용 기준은 자주 바뀌어 이 자료에 싣지 않았습니다. 검사 전 주사 일정은 「위고비·마운자로 사용 환자 — 검사 전 안전 안내」를 함께 보세요.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/glp1-starting-guide/