손 습진 스테로이드 연고 효능 순서

손바닥은 각질층이 두꺼워 안면처럼 약하게 시작하면 실패하기 쉽습니다. 급성 악화는 충분한 역가로 짧게 조절하고, 호전되면 중등도 제제로 낮추어 재발을 막는 흐름이 핵심입니다.



부위별 시작점과 사용량

두꺼운 손바닥	손등·굴측	급성 조절 기간	한 손 1회 도포량
Class 1-2	**Class 3-4**	**1-2**	**1 FTU**
급성·각화 병변	중등도부터	주 burst 후 감량	약 0.5 g

강한 순서대로 보는 외용 스테로이드

역가	성분	공급 O 확인 제품명	손 습진에서 쓰는 자리
1 초강력	**Clobetasol propionate 0.05%** US Class 1	더모베이트연고, 도모호론연고/크림, 베타베이트연고/크림, 프로솔로션/연고 두피액·샴푸 제형은 손 습진 표에서 제외	손바닥 급성 악화·두꺼운 각화·갈라짐. 짧게 충분히 쓰고 호전 즉시 step-down.
1-2 매우 강함	**Diflucortolone valerate 0.3%** 국내 분류상 very potent/potent	디푸코로션0.3%, 디푸코연고0.3% 항진균 복합: 라파엘크림, 트라보코트크림	손바닥·손가락 측면의 두꺼운 병변. 넓은 면적 장기 사용은 피함.
2-3 강함	**Desoximetasone 0.25%/0.05%** 데타손은 이 성분	데라파손로션, 데속시원겔0.05%, 데옥손겔0.05%/로션0.25%, 데타손로션0.25%/연고0.25%, 메타파손겔, 에스파손겔0.05%/로션0.25%, 제이데속시겔0.05%	손바닥·두꺼운 손가락 병변. 1차 조절 또는 초강력제 이후 전환.
4 중등도	**Methylprednisolone aceponate 0.1%** medium potency	아드반탄연고/크림, 토피솔밀크로션, 프레반탄연고	덜 심한 flare, 손등·손가락 굴측, 조절 후 step-down.
4 중등도	**Mometasone furoate 0.1%** 간헐 유지 근거가 있는 중등도 제제	더메타손크림, 더모타손엠엘이로션/크림, 더미손크림, 라벨리아로션/크림, 메이손로션/크림, 메타손크림, 모리코트로션/연고/크림, 모메덤크림, 모메손크림, 모메솔크림, 모메스킨크림, 모메코트크림, 모메타뉴크림, 모메탄크림, 모멘타로션/연고/크림, 모멘타손크림, 모멘타솔크림, 모멘트로션, 모타손로션/크림	손등·얇은 부위, 만성 재발의 간헐 유지. 얼굴·접히는 부위는 더 낮게.
6 약함	**Desonide 0.05%** low potency	나리스로션0.05%, 데소나로션0.05%/크림0.05%, 데소니아로션0.05%/크림0.05%, 데소니움로션0.05%, 데소덤크림0.05%, 데스오웬로션0.05%, 데스원로션0.05%, 마일드원크림0.05%, 아토맥스로션0.05%/크림0.05%, 제스윈크림, 케어덤로션0.05%, 토피덤로션0.05%	안면·얇은 피부·마무리용. 두꺼운 손바닥 1차 치료로는 대개 부족.

치료 단계별 처방 흐름

1. 급성 악화

손바닥: 초강력-강력 연고를 1일 1-2회.

야간: 보습제 후 면장갑, 필요 시 폐쇄요법.

2. Step-down

홍반·가려움·균열이 줄면 중등도 제제로 낮춤.

갑자기 끊기보다 3-7일 간격으로 횟수 조절.

3. 절약·유지

반복 재발: 주 2-3회 간헐 유지 고려.

TCI: 프로토픽·토피크로·타크로연고, 엘리델크림.

4. 난치성

강력 TCS 4주에도 중증이면 피부과 의뢰.

알리트레티노인 10/30 mg: 지질·임신 모니터링 필수.

같이 해야 약이 듣습니다

장벽 회복

무향 보습제를 손 씻은 직후와 취침 전 반복.

각화가 두꺼우면 urea 10% 크림 병용.

자극 차단

마른 작업은 면장갑, 젖은 작업은 비닐·니트릴 장갑.

장갑 안이 젖으면 바로 교체.

재평가 신호

진물·농·통증 증가, 진균 의심, 2주 치료 반응 부족.

난치성은 접촉피부염 감별·첩포검사.

검색 기준: 약학정보원 성분별 상세검색에서 공급유무 O, 피부 도포 제형(연고·크림·로션·겔)만 반영했습니다. Betamethasone valerate/dipropionate 복합제는 감염·진균·건선 적응증 확인 후 별도 선택합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: National Eczema Society Hand eczema factsheet(2023) · NCBI Bookshelf Topical Corticosteroids(2025) · NICE TA177 · 약학정보원 성분별 상세검색(공급유무 O, 2026-05-30 확인). 본 자료는 진료실 설명용이며 개별 처방 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/hand-eczema-steroid-potency/