혈압, 이렇게 재야 정확합니다

가정혈압 (Home BP) 측정법 — 집에서 잰 혈압이 치료 판단 기준입니다. 방법에 따라 40mmHg까지 달라집니다.

먼저, 이 네 가지 숫자만 기억하세요

재기 전	재기 전 안정	아침·저녁	가정혈압 기준
30분	**5분**	**2번씩**	**135/85**
담배·커피·술·운동 피하기	등받이 의자에 앉아서	1~2분 쉬고 한 번 더 재기	여러 날 평균으로 판단 (mmHg)

정확한 혈압은 자세부터입니다



등 기대기 · 발 바닥에 · 팔은 테이블 위

올바른 자세 5가지 · POSTURE	⚠ 틀리면 (단위: mmHg)
1. 등은 등받이에 편안히 기대 주세요	안 기대면 **5~10** 높게
2. 커프(팔에 감는 띠)는 심장 높이, 맨팔에 맞는 크기로 아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희) · 0:15:01–0:16:14	낮으면 **10~40** 높게 (높으면 반대)
3. 팔은 테이블 위에 올려 힘을 빼 주세요	팔을 테이블에 올리면 커프가 심장 높이에 맞춰집니다
4. 다리는 꼬지 않고, 발바닥은 바닥에 붙여 주세요	다리를 꼬면 **2~8** 높게
5. 재는 동안 움직이거나 말하지 마세요	움직이거나 말하면 값이 흔들립니다

누워서 재면 조금 높게 나오는 편이라 앉아서 재는 것이 기준입니다. 검증된 위팔에 감는 자동혈압계 기준이며, 손목형·손가락형은 권장하지 않습니다. 계절에 따라서도 달라지는데 여름엔 낮고 겨울엔 높은 편입니다.

매일 측정 루틴 · 4가지

언제	어떻게
아침 2번	일어나서 1시간 안에, 소변 본 후, 아침 식사·혈압약 드시기 전
저녁 2번	잠자리에 들기 전, 같은 팔·같은 자세로
처음 한 번	양쪽 팔 모두 재고, 그 뒤로는 더 높게 나온 팔에서
맥박이 불규칙하면	부정맥이 있는 분은 한 번에 3번 이상 재 주세요. 진료실에서도 확인하세요.[1]

판정 기준 · 진료 준비

방문 전 5~7일, 첫날 제외 평균 135/85mmHg 이상이면 고혈압입니다 (위·아래 중 한쪽만 넘어도)
집에서는 병원(140/90mmHg)보다 조금 낮게 나오는 게 보통이라 기준도 낮습니다
두 번 잰 값은 평균해서 적고, 높든 낮든 골라내지 말고 그대로 기록해 주세요. 날짜·시간·맥박·측정한 팔도 기록하세요.
아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희) · Q&A 21쪽
혈압계가 정확한지 궁금하시면 진료 오실 때 가져오세요 — 진료실 혈압계와 비교해 드립니다

이럴 땐 응급실·당일 진료 · WARNING

가슴 통증·호흡곤란·한쪽 마비·심한 두통이 있으면 혈압 수치와 관계없이 **즉시 응급실**로 가세요. 이런 증상 없이 안정 후 180/110mmHg[1] 이상이 반복되면 **당일 진료 연락**을 주세요. 수치와 관계없이 혈압약은 임의로 중단·조절하지 마세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 가정혈압 관리지침 · 2025 미국 고혈압 지침 (AHA/ACC)
함께 보기 — 진료실 설명 슬라이드 「아침 고혈압」 edu.gwanggyobarun.com/decks/cardio/htn/morning/

본 자료는 일반적인 안내이며, 환자별 목표 혈압과 측정 방법은 담당 의사와 상담해 결정하시기 바랍니다.

설명 슬라이드 | 집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/home-bp-measurement/