철결핍성 빈혈 식이요법 가이드

철결핍성 빈혈은 철분제만으로는 부족합니다. 헴철 식품, 비타민 C와 함께 먹기, 커피·우유 피하기로 음식 속 철의 흡수를 높이는 식사법을 정리했습니다.

한눈에 보는 핵심 수치

철이 특히 많은 음식	진단 기준 (혈색소)	하루 권장 섭취 (철분)
굴 7mg	**<12**	**18 / 8**
100g(5~6개) · 하루 권장량의 39%	여성 g/dL · 남성 <13	mg · 가임여성 / 남성

헴철 vs 비헴철 — 흡수율 3배 차이

헴철 — 고기·생선 속 철 · 흡수율 15~35%			비헴철 — 채소·콩 속 철 · 흡수율 2~20%		
식품	분량	철분 (권장량 대비)	식품	분량	철분 (권장량 대비)
굴	100g	7mg (39%) 5~6개	**검은콩·렌틸콩**	삶은 100g	약 3.3mg (18%) ½공기
간 (소·돼지)	50g	6.2mg (34%) 임신부 주의	**시금치·근대**	100g	2.7mg (15%) 반드시 데쳐서
바지락·홍합	100g	3~6mg 조개류	**호박씨·해바라기씨**	30g	2.3mg
소고기 안심·등심	100g	2.6mg (14%) 붉은 살코기	**두부**	½모 100g	1.5mg (8%) 단백질 보조
정어리·고등어	100g	1.5~2.7mg	**검은깨·들깨**	1큰술	1.4mg 요거트 토핑
닭고기 다리살	100g	1.3mg 가슴살보다 많음	**달걀 노른자**	1개	1mg (6%) 간편 보충
돼지고기 안심	100g	1.1mg 지방 적은 부위	**건자두·건포도**	30g	1mg 간식 대체

괄호 안 % = 가임기 여성 하루 권장량(18mg) 대비. 철분 함량은 일반적 평균치이며 조리법·품종에 따라 차이가 있습니다.

음식 속 철 흡수 — 돕는 것 vs 방해하는 것



철분 식품 + 비타민 C 과일·채소를 한 상에

함께 드세요	식후 2시간은 피하세요
비타민 C — 음식 속 식물성 철(비헴철) 흡수를 돕습니다 (오렌지·키위·딸기·파프리카)	**커피·녹차·홍차 (탄닌)** — 철 흡수를 크게 떨어뜨립니다. 식후 2시간 뒤에
구연산·유기산 — 식초·레몬즙 곁들이기	**우유·요거트·치즈 (칼슘)** — 철분과 흡수 경쟁
고기와 함께 먹기 (육류 인자) — 채소와 고기를 같이 먹으면 비헴철 흡수 ↑	**통밀·콩의 피틴산 / 시금치의 옥살산** — 데치기 + 비타민 C로 상쇄

철분 흡수를 높이는 하루 식단 (철분 약 14mg + 비타민 C 충분)

끼니	메뉴	포인트
아침 · 7~8시	잡곡밥 + 소고기 다짐 미역국 1/2공기 + 데친 시금치 + **오렌지주스 100ml**	비타민 C로 비헴철 흡수 ↑
점심 · 12~14시	현미밥 + 닭다리살 구이 + 검은콩 조림 + 파프리카 샐러드(레몬 드레싱) + 키위 1개	헴철 + 비헴철 동시
저녁 · 18~19시	현미밥 + 굴전 또는 바지락 미역국 + 두부조림 + 브로콜리 + 딸기 5개	굴 100g ≈ 철분 7mg
간식 · 식간	건자두 30g + 호박씨 한 줌 / 또는 요거트 + 검은깨 1큰술	**커피·녹차는 식후 2시간 후**

철분제를 드시는 분께

철분제 먹는 법(시간·간격·기간)은 「철분제 복용 시 주의사항」 한 장에 모았습니다 —
edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/iron-supplement/

진료실 설명 자료 — 철결핍성 빈혈: edu.gwanggyobarun.com/decks/heme/iron-deficiency-anemia/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한혈액학회 철결핍성 빈혈 진료지침 · 미국혈액학회(ASH) Iron Deficiency Guidelines · 보건복지부 한국인 영양소 섭취기준 (철분 18mg/일 가임여성) · 식약처 영양성분 데이터베이스

아산 28회 연수강좌 — Hemoglobin(혈색소) 이상에 대한 접근(최은지) 남성·폐경 뒤 여성: 위·대장 출혈 평가

본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 상황(임신·만성질환·출혈)에 따라 달라집니다. 동반질환이 있으면 담당의와 상담 후 식이를 정하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/iron-deficiency-anemia-diet/