위내시경 후 주의사항 (조직검사 없음)

조직을 떼어 낸 자리가 없어 출혈 위험은 거의 없고 회복도 빠릅니다. 수면(진정) 회복과 드물게 생기는 위험 신호만 알아 두세요.

검사 당일부터 다음 날까지



내시경은 식도·위·십이지장만 보고 나왔습니다

언제	이렇게 하세요	이건 피하세요
검사 직후 30분~1시간	수면에서 완전히 깰 때까지 쉬고, **보호자와 함께 귀가**합니다.	검사 후 **24시간** 운전·기계 조작·중요한 결정
1~2시간 뒤	물을 한 모금씩 마셔 보고, 사레가 없으면 미음·죽·연두부부터 드세요.	목 마취가 풀리기 전 음식
당일 저녁	평소 양의 2/3 정도만 천천히 드세요.	맵고 뜨거운 음식·술·카페인
다음 날부터	평소 식사·운동·사우나·여행 모두 괜찮습니다.	—

흔한 불편과 위험 신호

대부분 저절로 좋아집니다

- **목 따끔거림** — 내시경이 목을 지나가서 1~2일 갈 수 있습니다. 찬 음료가 도움이 됩니다.
- **트림·더부룩함** — 검사 때 넣은 공기 때문이며 1~2일 안에 좋아집니다.
- **졸림·가벼운 어지러움** — 수면 약 기운으로 당일에 남을 수 있습니다.

바로 119 또는 응급실로 가세요

- **가슴이나 배가 심하게 아프고 점점 심해질 때**(매우 드물게 식도·위에 구멍이 생긴 신호)
- **피를 토하거나 커피 찌꺼기 같은 것을 토할 때**
- **짜장면처럼 검고 끈적한 변이나 피가 섞인 변**(위장 출혈 신호)
- **어지러워 쓰러질 것 같거나 식은땀** — 보호자와 함께 119
- **38°C 이상 열·오한, 숨이 차거나 삼키기 어려울 때**

약 · 결과 · 다음 검사

평소 먹던 약	식사를 다시 시작한 뒤 평소대로 드세요. 조직검사를 하지 않아 따로 제한은 없습니다.
피를 묽게 하는 약	아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·리바록사반(자렐토) 등은 **진료실에서 들은 날짜에 다시 드세요**(보통 바로 다시 먹습니다). 헷갈리면 전화로 확인하세요.
당뇨약·인슐린	식사량이 돌아올 때까지 저혈당에 주의하고, 필요하면 상의하세요.
결과 안내	내시경 소견은 당일~며칠 안에 진료실 또는 문자로 알려 드립니다. 연락을 못 받으셨으면 전화 주세요.
다음 위내시경	정상이면 보통 **1~2년 뒤**입니다. 가족력·위염·역류·헬리코박터 양성 등이 있으면 간격이 더 짧아질 수 있습니다.

진료시간에는 광교바른내과 ☏ 031-893-4560 으로도 연락하세요.

조직검사나 헬리코박터 신속검사를 하셨다면 → **위내시경 후 주의사항 (조직검사 있음)**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ASGE Guidelines for sedation and anesthesia in GI endoscopy(Gastrointest Endosc 2018) · BSG/ESGE 항혈전제 내시경 지침(Gut 2021)

위내시경 잘 받으셨습니다. 본 안내는 조직검사 없는 위내시경 후 일반 권고로, 기저질환·복용약에 따라 담당 의사의 지시가 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-egd-clean/