스테로이드 처방 안압 위험과 안과 추적

투여 경로·용량·기간·과거 반응을 함께 확인

스테로이드가 안압을 올리는 경로

스테로이드 노출
눈 주변 · 전신 · 비강

↓

섬유주 변화
Glycosaminoglycan 침착
방수 유출 저하

↓

안압 상승
과거 반응·위험인자와
사용 기간을 함께 평가

처방 전 위험 확인

- ☐ 녹내장·고안압 병력 또는 **녹내장 1촌 가족력**, 과거 steroid response
- ☐ 아주 어린 연령·고령, **고도근시**, 1형 당뇨·결합조직질환
- ☐ 경로 ☐ 점안/안연고 ☐ 눈 주변 피부 ☐ 전신 ☐ 비강
  약제·용량 _____ 시작일 _____ 예정 기간 _____

시력 변화가 있으면 평가로 연결

시력 저하 · 안압 상승 평가

강의에서는 LASIK/LASEK 후 안압이 실제보다 낮게 측정될 수 있음을 설명했습니다. 수술력도 전달하고, 고용량·장기 처방이 필요하면 안과와 협진하며 관찰합니다.

경로와 기간에 따른 확인

노출	강의의 설명
점안·안연고·눈 주변 피부	눈에 가까운 부위에서 오래 쓰는 경우 안압 위험을 강조
전신 스테로이드	**고용량·장기간** 위험. 저용량도 **장기간**이면 위험 가능
비강 스프레이	드물지만 안압 상승 사례 보고. 오래 사용하면 설명과 안과 평가 고려

안과 확인 시점과 후속 계획

성경림 연자 Q&A · 비강 스테로이드

Responder는 사용 후 보통 **3~4주**에 안압이 상승한다고 설명하며, 그 시기에 안과에서 한 번 확인하고 이후에는 안과 전문의 소견을 따르도록 답했습니다.

강의에서 제시한 시간 정보	기록
Responder 빈도 **15~25%** 눈에서 **1~3개월** 꾸준히 사용하면 반응, **1개월 이상** 사용 시 주의	안과 확인 예정 _____ 평가 결과 _____ 후속 일정·처방 협의 _____

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
아산 28회 연수강좌 — 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림)

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/steroid-intraocular-pressure-card/