

체중은 줄이고, 근육은 지키기

식욕이 줄면 체지방뿐 아니라 근육도 줄 수 있습니다. 근력운동과 단백질은 GLP-1 치료의 안전장치입니다.

감량의 질은 근육이 결정합니다

같은 5 kg 감량이라도 근육이 많이 빠지면 피로, 요요, 낙상 위험이 커질 수 있습니다.

약으로 식사량이 줄어드는 시기에는 **근육에 사용 신호**를 계속 보내야 합니다. 주 2회만 해도 시작점으로 충분합니다.

LOWER

하체

의자에서 앉았다 일어서기, 벽 잡고 뒤꿈치 들기.

BACK


등

탄력밴드 당기기, 문고리 밴드 로우.

CHEST


가슴·팔

벽 푸시업부터 시작해 통증 없이 반복합니다.



식사량이 줄수록 단백질 우선순위가 올라갑니다

배가 빨리 부르면 밥보다 먼저 단백질과 채소를 먹는 순서가 도움이 됩니다.



한 끼를 다 못 먹는 날에도 단백질 공급이 끊기지 않게 해야 합니다.
개인의 신장기능과 질환에 따라 목표량은 진료에서 조정합니다.

ORDER

먹는 순서

단백질 → 채소 → 탄수화물 순서로 천천히 먹습니다.

OPTIONS

선택지

달걀, 생선, 살코기, 두부, 콩류, 그릭요거트 등을 활용합니다.

CAUTION

주의

만성콩팥병 등 질환이 있으면 단백질 목표는 개별 조정이 필요합니다.

집에서 하는 15분 루틴이면 충분합니다

기구보다 반복 가능한 동작과 통증 없는 범위가 중요합니다.

처음에는 걷기 후 근력 2종목만 붙이세요. 몸이 적응하면 종목 수보다 **반복의 안정성**을 늘립니다.

SET

기본 세트

의자 스쿼트 8-12회, 벽 푸시업 8-12회, 1-2세트.

PROGRESS

늘리는 법

통증 없이 쉬워지면 반복 수보다 세트를 하나 더합니다.

RECOVERY

회복

근육통이 심하면 하루 쉬고, 관절통이 있으면 동작을 바꿉니다.



집에서 하는 근력

운동을 시작하면 체중이 잠시 덜 빠질 수 있습니다

근육과 수분 변화 때문에 체중계가 느리게 보일 수 있지만, 허리둘레와 컨디션은 좋아질 수 있습니다.



체중 외 지표

체중만 보면 실망하기 쉽습니다. 허리둘레, 계단 오르기, 피로감, 혈당 같은 **기능 지표**를 같이 기록하세요.

WAIST

허리둘레

월 1회 같은 위치에서 측정합니다.

FUNCTION

기능

앉았다 일어서기, 계단, 걷기 시간이 쉬워지는지 봅니다.

LAB

검사

혈당·지질·간수치 개선은 체중보다 늦거나 빠르게 나타날 수 있습니다.

이번 회차는 근육을 지키는 주

이번 주는 체중보다 하체·등·가슴을 움직인 횟수를 기록합니다.

01 GLP-1 치료 중 근력운동은 선택이 아니라 **근육 보험**입니다.

03 집에서 15분, 주 2회면 충분히 시작할 수 있습니다.

02 배가 빨리 부르면 단백질부터 먹습니다.

04 체중만 보지 말고 허리둘레와 기능 변화를 같이 봅니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요