

역류성 식도염(GERD) 생활습관 관리

왜 가슴이 쓰리고 신물이 오르나요?

위와 식도 사이에는 **하부식도괄약근**이라는 조임쇠가 있어 위 내용물이 거꾸로 올라오지 않게 막아 줍니다. 이 조임쇠가 느슨해지거나, 배 안의 압력이 높아지거나, 위가 비워지는 속도가 느려지면 위산이 식도로 올라와 **가슴쓰림·신물 오름**이 생깁니다. 약은 위산을 줄여 증상을 가라앉히고, **생활습관 교정은 역류가 잘 일어나는 조건 자체를 줄입니다**. 둘은 대신하는 관계가 아니라 함께 가는 관계입니다.

조임쇠 이완

하부식도괄약근

높은 자세·과식·흡연이
조임쇠를 느슨하게 합니다

복압 상승

복부 비만 · 꽉 끼는 옷

배 안 압력이 높아지면
위 내용물이 위로 밀립니다

위 배출 지연

기름진 음식 · 과식

위가 늦게 비워질수록
역류할 시간이 길어집니다

근거가 가장 확실한 두 가지 먼저 이것부터

무엇을	어떻게	왜 도움이 되나
① 체중 감량	과체중·복부비만이라면 체중을 줄이는 것 이 가장 우선입니다. 무리한 단기 감량보다 꾸준히 줄여 유지하는 쪽이 낫습니다.	복부 지방이 줄면 배 안 압력이 낮아져 역류 자체가 줄어듭니다. 생활습관 항목 중 가장 강하게 권고됩니다.
② 취침 전 공복	잠들기 2~3시간 전부터는 먹지 않기 . 야식·늦은 회식이 잦다면 이것부터 조정합니다.	누운 자세에서는 중력의 도움이 없어 역류가 쉬워집니다. 위가 비워진 뒤 높은 것만으로 야간 증상이 줄어듭니다.

주의 — 생활습관 교정은 약을 **대신하지 않습니다**. 증상이 좋아졌다고 처방약을 임의로 끊거나 줄이지 마시고, 조정이 필요하면 진료 때 상의해 주세요.

밤에 증상이 있을 때



상체 전체를 높이기

침대 머리 쪽을 올리거나 경사형 쿠션으로 상체를
비스듬히



베개만 겹쳐 베기

목만 꺾이고 배가 눌러 오히려 역류가 늘 수
있습니다



식후 바로 눕지 않기

식사 후에는 상체를 세우고 가볍게 움직입니다



오늘부터 어떻게 하나요?

하루 일정에 적용하기 저녁 시간이 핵심

잠드는 시각이 자정이라면

저녁 식사

~21시

→

2~3시간 공복 유지

→ 24시 취침

늦게 귀가해 저녁이 늦어졌다면

늦은 저녁

23시

→

가볍게 · 소량으로

→ 상체 높여 취침

식사는 **한 번에 많이보다 소량씩 나누어** 드시고, 식후에는 바로 눕지 말고 **상체를 세운 자세**를 유지하세요. 과식과 급하게 먹는 습관은 위 배출을 늦춰 역류를 키웁니다.

권장하는 습관 vs 피하는 것이 좋은 습관

권장	피하는 것이 좋음
규칙적인 식사 시간 유지	과식 · 급하게 먹기
취침 2~3시간 전 공복 유지	늦은 밤 야식 · 자기 직전 음주
식후 상체를 세운 자세 유지	식사 직후 눕기 · 바로 몸을 굽히는 운동
적정 체중 유지 (특히 복부)	꽉 끼는 옷 · 복대 등 복부 압박
증상 유발 음식 개별 확인 후 제한	본인에게 증상을 일으키는 카페인 · 탄산 · 기름진 음식
흡연 중이라면 금연	흡연 — 조임쇠를 느슨하게 합니다

음식은 사람마다 다릅니다 — 자극적인 음식을 일괄로 다 끊을 필요는 없습니다. **증상일기**에 무엇을 먹고 언제 증상이 있었는지 적어 오시면, 본인에게 실제로 문제가 되는 것만 골라 제한할 수 있습니다.

이런 신호는 생활습관만으로 미루지 마세요

증상	왜 확인이 필요한가
삼키기 힘들거나 걸리는 느낌	식도가 좁아졌는지 등 원인 확인이 필요합니다
의도하지 않은 체중 감소	다른 원인을 함께 살펴야 합니다
검은 변 · 피를 토함 · 빈혈	출혈 가능성이 있어 빠른 진료가 필요합니다
약을 써도 증상이 계속됨	진단과 치료 방향을 다시 볼 필요가 있습니다

가슴 통증은 심장 문제와 구분이 필요합니다 — 쥐어짜는 듯한 통증, 식은땀, 팔·턱으로 뻗치는 통증, 숨참이 함께 있으면 역류로 넘기지 마시고 **즉시 진료**를 받으십시오.

핵심만 기억하세요

① 과체중이라면 **체중 감량**이 가장 중요합니다. ② 취침 **2~3시간 전**부터는 먹지 않습니다. ③ 밤에 증상이 있으면 **상체 전체를 높여** 주무십시오. ④ 생활습관 교정은 약을 대신하지 않으니 **임의로 중단하지 말고** 함께 실천하십시오.

