

위내시경 후 주의사항 (조직검사 없음)

위내시경 (EGD, Esophagogastroduodenoscopy)에서 조직검사를 하지 않으신 분을 위한 안내입니다. 조직을 떼낸 부위가 없어 출혈 위험은 거의 없고 회복도 매우 빠르지만, 진정 (수면) 회복과 가벼운 이후통, 드문 합병증 신호는 알아두시면 좋습니다.

즉시 119 또는 응급실 · 광교바른내과 ☎ 031-893-4560

- 1. 심한 가슴·복통이 지속·악화** — 만지면 더 아픈 배 또는 가슴, 펴기 어려운 자세. 천공 (Perforation, 식도·위벽에 구멍 — 매우 드물지만 가능) 신호.
- 2. 토혈 또는 커피찌꺼기 색 구토** — 피가 섞인 토, 또는 짙은 갈색 구토물. 위장 출혈 의심 신호.
- 3. 검은 변 (흑색변)** — 평소와 다른 끈적한 검은 변. 위장 출혈 가능성.
- 4. 어지러움·식은땀·실신** — 일어날 때 잡아야 하는 정도, 손발 차갑고 식은땀. 즉시 119, 보호자 동반.
- 5. 38°C 이상의 발열·오한** — 떨림 동반, 감염 가능성.



내시경이 식도·위·십이지장을 통과했지만 조직을 떼지 않아 회복이 매우 빠릅니다.

회복 단계 (당일~1일)

- 1. 진정 회복 (30분~1시간)** — 수면 내시경 후 어지러움·졸림이 남아 있어 **보호자 동반 귀가**, 당일 운전·중요 결정·기계 조작 X.
- 2. 가벼운 이후통** — 내시경이 목을 지나갔으므로 1-2일 정상. 찬 음료·아이스크림이 도움. 침 삼킬 때 통증 정도는 보통 자연 호전.
- 3. 식이 재개** — 진정 회복 후 **1-2시간** 뒤 가벼운 식이부터 시작 (미음·죽·연두부). 사레가 들리지 않으면 부드러운 식이로 진행.
- 4. 당일 저녁** — 평소 양의 2/3 정도, 자극적·매운·뜨거운 음식 회피. 음주·카페인 당일 X.
- 5. 다음날부터** — 일반 식이 복귀 가능. 운동·사우나·여행도 평소대로.

약물 재개 · 다음 검사

- 1. 평소 약** — 식사 재개 후 평소대로 복용. 조직검사를 하지 않았으므로 추가 제한 없음.
- 2. 항혈전제 (피를 묽게 하는 약)** — 아스피린·플라빅스·와파린·자렐토 등을 평소 드시는 분은 시술 의사 진료실에서 받으신 재개 시점을 따르세요 (보통 즉시 재개).
- 3. 당뇨약·인슐린** — 식사량 회복까지 저혈당 주의, 필요시 의사 상담.
- 4. 결과 통보** — 영상·내시경 소견은 당일~며칠 내 외래·문자로 통보. 받지 못하시면 ☎ 031-893-4560 전화.
- 5. 다음 위내시경 시점** — 정상 소견이면 보통 **1-2년 후**. 가족력·증상·위험 인자 (위염·역류·헬리코박터 양성)에 따라 더 짧을 수 있어 의사가 안내합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 소화기내과 전문

위내시경 잘 받으셨습니다. 본 안내는 조직검사 없는 일반 위내시경 후 권고로, 환자별 상황 (기저질환·복용약)에 따라 다를 수 있습니다. 응급 신호 발생 시 즉시 연락주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/endoscopy/post-egd-clean/