

예방접종 후 유의사항 안내



모든 백신 공통 안내

접종 후 며칠간 나타나는 대부분의 반응은 우리 몸이 면역을 만드는 정상 과정이며 1~2일이면 좋아집니다.

이 안내문은 그냥 지켜봐도 되는 반응과 병원에 연락해야 하는 신호를 구분해 드립니다.

백신 종류별로 조금씩 다른 점은 뒷면에 정리했습니다.

15~30
분

접종 후에는 바로 귀가하지 마시고 병원에 머무르세요.

중증 알레르기 반응(아나필락시스)은 대부분 **접종 직후 30분 이내**에 나타나기 때문입니다.

과거에 접종·약물·음식으로 심한 알레르기를 겪은 적이 있으면 30분을 채워 관찰합니다.

귀가 후에도 그날 하루는 혼자 있기보다 가족이 함께 있는 것이 좋습니다.

흔한 정상 반응

대개 1~2일 내 호전



접종 부위

통증·부기·발적
가장 흔한 반응



미열·오한

37~38°C대
보통 하루 이틀



근육통·피로

몸살 기운
면역 형성 과정



두통·식욕저하

일시적
수분 섭취로 완화

집에서 이렇게 하세요

상황	이렇게 하세요
접종 부위가 아프고 부을 때	문지르지 마시고 깨끗하게 유지하세요. 부기가 있으면 차가운 물수건으로 가볍게 냉찜질합니다. 팔을 평소처럼 가볍게 움직이면 오히려 통증이 덜합니다.
열이 나거나 몸이 쑤실 때	해열진통제(아세트아미노펜 등)를 복용해도 됩니다. 물을 충분히 드시고 꼭 쉬세요. 예방 목적으로 접종 전에 미리 먹는 것은 권하지 않습니다.
씻어도 되나요	가벼운 샤워는 괜찮습니다. 다만 접종 당일은 사우나·목욕탕·격렬한 운동·음주 는 피하세요.
일상생활	대부분 평소대로 지내도 됩니다. 접종 당일은 무리한 일정을 피하고 몸 상태를 살피세요.

이런 증상이면 즉시 119 또는 응급실

- 입술·얼굴·혀가 붓는다
- 온몸에 두드러기가 퍼진다
- 숨쉬기 힘들거나 쌉쌉거린다
- 어지럽고 정신을 잃을 것 같다
- 가슴이 아프거나 심하게 두근거린다
- 경련을 하거나 의식이 흐리다

⚠ 아나필락시스는 본 단위로 진행합니다. "조금 기다려 볼까" 하지 마시고 바로 119에 연락하세요.

병원 진료시간에 문의하실 상황

39°C 이상 고열이 계속되거나 열이 2~3일 이상 이어질 때 · 접종 부위의 통증·발적이 점점 심해지거나 고름이 나올 때 · 팔을 들기 어려운 정도의 심한 통증 · 며칠이 지나도 나아지지 않고 새로운 증상이 생길 때, 판단이 어려우면 참지 마시고 **병원에 전화** 주세요.

접종 후 회복 흐름

직후 30분

병원에 머무르며 관찰합니다.
어지럼·두드러기·숨참은
즉시 직원에게 알려주세요.

접종 당일

통증·미열이 시작될 수 있습니다.
무리한 일정·음주는 피하세요.

1~2일

반응이 가장 뚜렷한 시기이며
대개 이때 좋아집니다.

3일 이후

증상이 남아 있거나 심해지면
진료를 받으세요.

백신별로 다른 점 · 특별한 상황



앞면 공통 안내와 함께 보세요

내가 맞은 백신, 무엇이 다른가요?

백신	특히 알아두실 점
인플루엔자(독감)	반응이 가벼운 편입니다. 접종 부위 통증이 가장 흔하고 미열·근육통은 1~2일이면 좋아집니다. 백신 때문에 독감에 걸리지는 않습니다 (사백신). 접종 후 항체가 생기기까지 약 2주가 걸립니다.
대상포진 — 싱그릭스	면역반응이 강해 접종 부위 통증·근육통·피로·발열이 비교적 흔합니다. 이는 효과가 좋다는 신호에 가깝고 보통 2~3일이면 가라앉습니다. 2차 접종 때 반응이 더 셀 수 있고, 힘들어도 2회를 모두 맞아야 합니다.
대상포진 — 생백신	반응은 상대적으로 적습니다. 드물게 접종 부위에 수두 같은 물집이 생길 수 있는데, 이때는 거즈로 덮고 임신부·신생아·면역저하자와의 접촉을 피하세요. 면역저하자에게는 금기 입니다.
폐렴구균	접종 부위 통증·발적이 흔합니다. 이전에 폐렴구균을 맞은 적이 있으면 국소 반응이 더 클 수 있습니다. 팔 전체가 붓고 아픈 경우가 있으나 대개 며칠 내 좋아집니다.
Tdap · Td (파상풍)	접종 부위 통증·빠근함이 며칠 갈 수 있습니다. 팔을 아예 안 쓰기보다 가볍게 움직이는 편이 회복에 낫습니다.
A형·B형 간염	대체로 순한 편이며 국소 통증·피로감 정도입니다. 여러 차례 나눠 맞는 백신이므로 다음 접종 일정을 꼭 지켜 주세요.
코로나19	발열·근육통·피로가 하루 이틀 있을 수 있습니다. 드물지만 흉통, 두근거림, 숨참이 생기면 (젊은 남성, 접종 후 1주 이내) 지체 말고 진료를 받으세요 .

* 같은 백신이라도 제품과 개인에 따라 반응은 다를 수 있습니다. 위 내용은 흔한 경향을 정리한 것입니다.

이런 분은 미리 알려 주세요

해당되는 경우	주의할 점
항응고제·항혈소판제 복용 (와파린·아스피린 등)	근육주사 후 2분 이상 꼭 눌러 지혈하고 문지르지 마세요 . 멍이 크게 번지거나 붓기가 계속 커지면 병원에 알려 주세요.
면역저하 (항암·이식·면역억제제·고용량 스테로이드)	생백신은 금기 입니다. 접종 전 반드시 치료 내용을 알려 주세요. 백신 효과가 평소보다 낮을 수 있습니다.
임신 중·수유 중	독감·Tdap 등은 임신 중에도 권장되지만 백신마다 다릅니다. 임신 여부를 꼭 알려 주세요 . 수유는 대부분 그대로 하셔도 됩니다.
이전 접종 때 심한 반응	두드러기·호흡곤란 등을 겪으셨다면 반드시 접종 전에 말씀해 주세요. 관찰 시간을 늘리거나 백신을 바꿔야 할 수 있습니다.
접종 당일 발열·급성 질환	38°C 이상 열이 있거나 몸이 많이 아플 때는 미루는 편이 낫습니다. 가벼운 감기는 대개 접종 가능합니다.

자주 묻는 질문

Q. 열이 나는데 정상인가요?

미열·근육통·피로감은 면역이 만들어지는 과정의 흔한 반응으로 대개 1~2일 내 가라앉습니다. 불편하면 해열진통제를 드시고 수분을 충분히 섭취하세요. 다만 39°C 이상이 지속되거나 열이 **2~3일 이상** 이어지면 진료를 받으세요.

Q. 다른 백신을 같은 날 맞아도 되나요?

대부분의 백신은 같은 날 다른 부위에 동시 접종이 가능합니다. 다만 백신 조합에 따라 간격을 두어야 하는 경우가 있어 접종 전 상담이 필요합니다.

