

# 소변검사 채뇨 안내

소변검사는 단백뇨·혈뇨·요로감염·당뇨 관련 이상을 확인하는 기본 검사입니다. 피부·질분비물·변기 물이 섞이면 재검이 필요할 수 있어, 중간뇨를 깨끗하게 받는 것이 중요합니다.



## 좋은 소변 검체의 4가지 조건

|                                              |                                            |                                          |                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>방법</p> <p><b>중간뇨</b></p> <p>처음 소변은 버림</p> | <p>양</p> <p><b>1/3</b></p> <p>컵 정도면 충분</p> | <p>제출</p> <p><b>즉시</b></p> <p>접수대 제출</p> | <p>주의</p> <p><b>오염</b></p> <p>뚜껑 안쪽 만지지 않기</p> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 채뇨 순서

- 1 손 씻기 — 컵 뚜껑을 열 때 뚜껑 안쪽과 컵 안쪽을 만지지 않습니다.
- 2 처음 소변은 변기에 — 처음 1~2초 소변은 버리고 중간 부분부터 받습니다.
- 3 컵 1/3 정도 채우기 — 컵을 피부에 닿지 않게 하고, 변기 물이 튀지 않게 합니다.
- 4 뚜껑을 바로 닫기 — 바깥면을 닦고 접수대 또는 검사실에 바로 제출합니다.

## 검사 전 알려주세요

### 결과에 영향 줄 수 있음

생리 중 또는 직후 — 혈뇨처럼 보일 수 있음  
 격한 운동 직후 — 일시적 단백뇨·혈뇨 가능  
 비타민 C 고용량 — 일부 시험지 반응 간섭 가능  
 항생제 복용 중 — 배양검사 결과에 영향

### 요로감염 의심 시

소변 볼 때 통증 또는 잔뇨감  
 빈뇨·절박뇨가 갑자기 생김  
 옆구리 통증·발열 동반  
 항생제 시작 전 채뇨가 가장 좋음

### 재검이 필요한 흔한 이유

컵 안쪽을 손으로 만졌거나, 처음 소변을 그대로 받았거나, 생리혈·질분비물·변기 물이 섞인 경우에는 세균·혈뇨·단백뇨가 실제보다 높게 나올 수 있습니다. 애매하면 새 컵으로 다시 받는 편이 정확합니다.

