대장내시경 준비 안내문

대장내시경은 장을 깨끗이 비울수록 정확합니다. 변이 맑은 노란 물처럼 나올 때까지 비워야 용종을 놓치지 않습니다. 3일 전 식사 조절부터 당일 내원까지 한 장으로 정리했습니다.

3일 준비 일정 — 검사 전 식사와 장정결제

언제	먹어도 되는 것 · 할 일	피할 것
3일 전 **찌꺼기 적은 식사 시작**	흰밥, 흰빵, 두부, 계란, 닭가슴살, 흰살생선. 변비가 있는 분은 이 단계가 더 중요합니다.	잡곡밥·현미·김치·해조류·견과류, 씨 있는 과일(포도·수박·참외·키위·딸기)
1일 전 **식사 줄이기**	아침·점심은 흰죽·미음·두부 등 부드러운 음식. **저녁부터 금식** — 맑은 물·투명한 이온음료·맑은 사과주스만.	우유·과육 있는 주스·커피·붉은·보라색 음료
검사 당일	검사 30분 전 도착.	수면내시경 뒤 운전(보호자 동반 필수)

장정결제 복용 — 받은 약에 따라 다릅니다(시각은 예약 때 받은 복용 시간표대로)

물약을 받으신 분 (원내: 원프렙)	알약을 받으신 분 (원내: 오라팡·휴라팡, 수프렙 미니)
전날 저녁에는 마시지 않습니다. **검사 당일 4~5시간 전**에 시작해 두 번 나눠 마십니다 — 약 1컵(230mL)을 10분간, 이어 물 2컵(460mL)을 20분쯤(약 30분). 마치면 한 번 더. 약과 물 합쳐 **약 1.4L**.	**전날 저녁**(오라팡·휴라팡은 이른 저녁)에 1차, 10~12시간 뒤 **검사 당일 오전**에 2차. 1차·2차 모두 같은 방법(한 차례 물 약 1.3L): • 오라팡 14정을 물 425mL와 함께 → 1시간 동안 물 425mL를 두 번 더 • 수프렙 미니 6포를 물 420mL와 함께 → 1시간 동안 물 420mL를 두 번 더 • 휴라팡 12정을 10분마다 2정씩 물 159mL와 함께 → 물 318mL 더 **검사 2시간 전까지** 약과 물을 모두 마칩니다.

왜 깨끗이 비워야 할까요



변이 남으면(왼쪽) 용종이 가려집니다

대장내시경의 정확도는 **장을 얼마나 깨끗이 비웠는지(장정결)**가 결정합니다. 변이 남아 있으면 작은 용종을 놓칠 수 있습니다.

변 색깔 자가 체크 — ⑤ 맑은 노란 물에 도달하면 검사할 수 있습니다.

① 짙은 갈색	② 흐린 갈색	③ 노란 갈색	④ 노란 물	⑤ 맑은 노란 물

①~③ 아직 더 비워야 함 · ④ 거의 다 됨 · ⑤ 검사 가능

평소 드시는 약 — 3가지로 나눠 확인하세요

약	검사 전 원칙
혈압약·심장약·갑상선약	**계속 복용** — 검사 당일 아침에도 소량의 물과 드십니다.
당뇨약·인슐린	**예약 때 받은 개별 지시대로 조정** — 금식 중에는 저혈당 위험이 있어 약마다 줄이거나 거르는 방법이 다릅니다. 스스로 끊거나 평소대로 맞지 마세요. 이름이 '-글리플로진'으로 끝나는 당뇨약(SGLT2 억제제)은 **검사 3일 전부터 쉬는 경우가 많으니** 예약 때 꼭 알려 주세요.
항혈전제 (아스피린·와파린 등)	**의료진과 상의 필수** — 스스로 끊지 마세요. 끊을지, 며칠 전 끊을지는 의료진이 정합니다.

내원할 때

30분 전 도착(수액 주사 길을 잡을 시간) · **보호자 동반**, 수면내시경 뒤 24시간 운전 금지 · 편한 옷차림, 귀중품 최소화 · 신분증·처방전·**복용 약 목록** 지참

⚠ 장정결제를 먹다가 **심한 구토·복통·혈변**이 있으면 약을 멈추고 즉시 ☎ 031-893-4560 으로 연락하세요.

함께 보기 — 저용량(1L) 장정결제 설명(진료실 자료): edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/bowel-prep-low-volume/ · 항혈전제 복용자: edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/antithrombotic-pre-endoscopy/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기내시경학회 가이드라인 · ASGE 2023 · 미국당뇨병학회 진료지침 2026(수술·시술 전 SGLT2 억제제)

본 안내문은 일반적 권고이며, 환자별 신장·심장 상태와 복용 약제에 따라 처방이 달라질 수 있습니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/