

과민성장증후군(IBS) 식사 가이드 — 저FODMAP 3단계

과민성장증후군은 장과 뇌의 신호가 예민해져 생기는 **장-뇌 상호작용 질환**입니다. 마음의 문제가 아니며, 식단 조절만으로도 10명 중 5~8명에서 복통·팽만 증상이 뚜렷이 좋아집니다.

🔑 FODMAP이 증상을 일으키는 원리



FODMAP = 장에서 흡수되지 않는 발효성 당류

- ① **소장에서 흡수되지 못하고** — 물을 장 안으로 끌어들이며 설사·꾸르륵 소리를 유발합니다.
- ② **대장에서 세균에 의해 발효되어** — 가스가 차고 장이 부풀어 팽만감이 생깁니다.
- ③ **예민해진 장은 이 자극을 통증으로** — 같은 가스량에도 더 아프게 느낍니다.

대표 FODMAP — 과당(사과·꿀) · 유당(우유) · 프락탄(마늘·양파·밀)
갈락토올리고당(콩류) · 폴리올(자일리톨·수박)

📅 저FODMAP 식단 3단계 — 반드시 끝까지 진행하세요

단계	기간	하는 일
1단계 · 제한	2~6주만!	고FODMAP 식품을 모두 줄이고 증상 일지를 씁니다. 좋아지는지 확인하는 진단 단계이며, 오래 이어가면 장내 유익균과 영양이 손해 를 봅니다.
2단계 · 재도입	6~8주	FODMAP 그룹을 한 번에 하나씩, 3일 간격 으로 다시 먹어 보며 나의 '진짜 범인'과 견딜 수 있는 양을 찾습니다.
3단계 · 개인화	평생 유연하게	문제 없는 음식은 모두 되돌리고, 문제 식품만 양을 조절합니다. 가장 다양하게 먹으면서 증상 없는 식단 이 최종 목표입니다.

저FODMAP 식단으로 **50~86%**에서 복통·팽만이 좋아집니다. 처방약과 함께, 음식 조절이 증상 관리의 중심입니다.

❓ 흔한 오해 바로잡기

흔한 오해	바로 알기
"평생 엄격하게 가려 먹어야 한다"	엄격한 제한은 2~6주만 . 그 후엔 다시 늘려가는 것이 정석입니다.
"글루텐(밀)을 무조건 끊어야 한다"	진짜 원인은 글루텐이 아닌 밀의 프락탄 인 경우가 많습니다. 설사형은 셀리악병 검사를 먼저 확인합니다.
"스트레스 때문이니 마음먹기 나름이다"	장 운동·감각 이상이 확인되는 실제 신체 질환 입니다. 스트레스는 악화 요인일 뿐 원인의 전부가 아닙니다.

👤 과민성장증후군의 진단·유형·약 치료 설명은 진료실 「**과민성장증후군**」 설명 자료 — edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/ibs/ · 이 안내문은 성인용입니다. 아이의 복통에는 쓰지 말고 진료 때 상의하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ACG 2021 · AGA 2022 · Rome IV · Monash University FODMAP Database

본 자료는 일반적 권고이며, 증상·동반질환에 따라 식이 처방이 달라질 수 있습니다. 제한기는 가능하면 의료진·영양사와 함께 진행하세요. 다음 장에 한국 음식 FODMAP 신호등과 실천 수칙이 이어집니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/ibs-fodmap-diet/

한국 음식 FODMAP 신호등과 실천 수칙

김치·된장까지 끊을 필요는 없습니다. 한식 기준으로 '마음껏 · 양 조절 · 잠시 중단'을 나누고, 일상 실천법을 정리했습니다.

🍽️ 한국 음식 FODMAP 신호등 (제한기 2~6주 기준)

진료실 한 줄 요약 — 피할 것: 잡곡·양배추·마늘·양파·유제품·콩·사과 / 관참은 것: 쌀밥·감자·두부·바나나·당근. 종류·양·조리법에 따라 판정이 달라지니 아래 표로 확인하세요.

분류	대표 식품	한식 팁
● 안심 적정량 선택	쌀밥·감자 · 고기·생선·달걀 · 단단한 두부 · 오이·당근·상추·애호박 · 바나나·딸기·키위	배추는 한 끼 75g까지 안전 — 배추전·겉절이 소량 가능
● 소량 가능 양 조절	김치 2~3큰술 · 전통 된장 1큰술(12g) · 간장 · 고구마 ½개	김치는 1~2젓가락부터 늘리며 증상 기록 — 끊지 않아도 됩니다
● 잠시 중단 제한기 회피	마늘·양파(소량도) · 밀가루(빵·면·라면) · 사과·배·수박 · 우유·아이스크림 · 콩류·버섯 · 꿀·올리고당	고추장·쌈장·시판 양념은 마늘·물엿 때문에 제한기엔 보류 전통 발효 사워도우 는 예외



대체하기 · '무엇을'보다 '얼마나'

마늘 → **마늘향 기름·파 초록 부분·생강** · 밀면 → **쌀국수·100% 메밀** · 우유 → **락토프리** · 꿀 → **설탕 소량**
같은 식품도 양에 따라 판정이 달라집니다 (Monash 측정 기준).
제한기 한 끼 예: 쌀밥 · 생선구이 · 달걀찜 · 오이 · 당근

📖 매일 실천 수칙 7

1. 규칙적으로, 소량씩, 천천히 먹고 과식을 피합니다.	2. 증상 일지 — 먹은 것과 증상을 2주간 기록해 나만의 유발 음식을 찾습니다.
3. 마늘·양파부터 점검 — 가장 흔한 '숨은 범인'입니다.	4. 성분표 확인 — 양념·가공식품의 마늘·양파·밀·올리고당.
5. 카페인·알코올·탄산·고지방·강한 매운맛 을 줄입니다.	6. 변비형은 수용성 섬유 (차전자피·귀리)를 소량부터 천천히 + 물 충분히.
7. 좋아져도 재도입 단계를 꼭 진행 — 평생 제한이 목표가 아닙니다.	

⚠️ 식단 조절보다 진료가 먼저인 위험 신호

다음 중 하나라도 있으면 식단 실험을 멈추고 바로 진료·검사를 받으세요 — **혈변·흑색변** · 의도하지 않은 **체중 감소** · **빈혈** · 자다가 깰 정도의 야간 복통/설사 · **50세 이후 새로 시작된 증상** · 대장암/염증성 장질환 가족력 · 발열. ☎ 031-893-4560