

열이 나면 — 독감·코로나 검사는 언제 받나요?

감기약에 해열 성분이 들어 있으면 열이 일시적으로 내려갈 수 있습니다. **약을 먹는데도 열이나 오한이 났고 나오면 독감(Influenza)-코로나19(COVID-19) 검사를 받으러 오세요.**

이럴 때 검사하러 오세요

FEVER

38도 이상 열

해열 성분이 든 감기약을 먹는데도 열이 났고 나올 때

CHILLS

오한

약을 먹는데도 으슬으슬 떨리는 오한이 올 때

48 HOURS

증상 시작 48시간 안


독감 약은 증상이 시작되고 48시간 안에 써야 효과가 큼니다

BEFORE HOLIDAY

주말·연휴 전

병원이 쉬는 동안 48시간이 지나지 않게 미리 검사합니다

검사 결과는 이렇게 읽습니다



결과	이렇게 받아들이세요
음성	너무 일찍 검사하면 바이러스가 덜 붙어 음성이 나올 수 있습니다. 하루 지나 다시 하면 양성도 됩니다. 증상이 계속되면 다시 오세요.
양성	양성이면 감염 가능성이 높습니다. 증상과 유행 상황을 함께 보고 판단합니다.
증상 없음	증상·노출 여부에 따라 검사 시점을 상담하세요. 열이 없어도 호흡기 증상이 생기면 진료받으세요.

독감이면 이렇게 치료합니다

방법	먹는 약 · 타미플루	주사 · 페라미플루
기간	5일 동안 먹습니다	1회 맞으면 끝납니다
특징	처방받아 집에서 먹습니다	병원에서 한 번에 끝나지만 비쌉니다

치료 중에도 열이 계속되면 **폐렴 여부**를 엑스레이로 확인합니다. 나이가 많거나 지병이 있거나 증상이 심하면 48시간이 지나도 치료할 수 있습니다.

집에서는 · AT HOME

공간을 나누고 식사도 따로 합니다.
가족과 있을 때는 **마스크**를 씁니다.
손 씻기를 자주 합니다.
물을 충분히 마시고 꼭 쉽니다.

흔한 오해 · MYTH

“몸살엔 수액이나 엉덩이 주사 한 대면 된다” — 증상을 잠시 누를 뿐, 독감 치료는 아닙니다.
“독감도 일반 감기약으로 충분하다” — 감기약은 증상만 덜어 줍니다.
“땀을 빼면 낫는다” — 치료법이 아닙니다. 탈수를 조심하세요.
“음성이니 독감이 아니다” — 초기엔 음성일 수 있습니다.

바로 진료가 필요합니다 · URGENT

숨이 차거나 가슴이 답답하고 아플 때
물을 못 마시거나 소변이 크게 줄 때

입술이 파래지거나 의식이 흐려질 때
좋아지다가 다시 열·기침이 심해질 때

65세 이상·임신부·만성 심장·폐·신장 질환·당뇨·면역저하가 있으면 증상이 가볍더라도 일찍 진료를 받으세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 질병관리청 인플루엔자 관리지침 2025~2026 · 중증 인플루엔자 치료지침(대한내과학회지 2014) · CDC Rapid Influenza Diagnostic Tests 2026 · CDC Influenza Antiviral Medications 2026

본 자료는 열이 날 때 독감·코로나 검사 시점을 안내하기 위한 일반 자료입니다. 나이, 임신 여부, 면역상태, 기저질환에 따라 검사와 치료 시점이 달라질 수 있으니 진료 시 상의해 주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/flu-covid-fever-testing/