


대장내시경 후 주의사항 (용종 없음·절제 없음)

대장내시경 (Colonoscopy)에서 용종이 없거나 절제하지 않으신 분을 위한 안내입니다. 절제 부위가 없어 출혈 위험은 거의 없고 회복도 빠르지만, 진정 (수면) 회복과 드문 합병증 신호는 알아두시면 좋습니다.

즉시 119 또는 응급실 · 광교바른내과 ☎ 031-893-4560

- 심한 복통이 점점 악화** — 만지면 더 아픈 배, 펴기 어려운 자세. 천공 (Perforation, 장벽에 구멍 — 매우 드물지만 가능) 신호.
- 다량 혈변 · 검은 변** — 변기에 흘러내릴 정도의 빨간 피 또는 커피찌꺼기 색 검은 변. 일반 대장내시경에서는 드물지만 가능.
- 어지러움·식은땀·실신** — 일어날 때 잡아야 하는 정도, 손발 차갑고 식은땀. 즉시 119, 보호자 동반.
- 38°C 이상의 발열·오한** — 단순 미열 아닌 떨림 동반. 감염 가능성.



대장 안에서 때낸 부위가 없어 회복이 빠릅니다 — 진정 회복 외에는 큰 제한이 없습니다.

회복 단계 (1-2일)

- 진정 회복 (30분~1시간)** — 수면 내시경 후 어지러움·졸림 남아 있어 **보호자 동반 귀가**, 당일 운전·중요 결정·기계 조작 X. 검사 중 주입한 공기로 복부 팽만이 있을 수 있으며 가스 배출하면 호전됩니다.
- 식이 재개 (당일)** — 진정 회복 후 미음·죽부터 한 모금씩, 사레가 들리지 않으면 부드러운 식이 (연두부·흰살생선·삶은 채소).
- 당일 저녁** — 평소 양의 2/3 정도, 천천히 씹어 드세요. **음주·카페인·탄산·자극 음식 당일 회피**.
- 다음날부터** — 일반 식이 복귀 가능. 가벼운 가스·복부 팽만은 1-2일 내 자연 호전. 운동·사우나·여행도 컨디션 보고 정상 활동.

약물 재개 · 다음 검사

- 평소 약** — 식사 재개 후 평소대로 복용. 절제 부위가 없으므로 추가 제한 없음.
- 항혈전제 (피를 묽게 하는 약)** — 아스피린·플라빅스·와파린·자렐토 등을 평소 드시는 분은 시술 의사 진료실에서 받으신 재개 시점을 따르세요 (보통 빠르게 재개 가능).
- 당뇨약·인슐린** — 식사량 회복까지 저혈당 주의, 필요시 의사 상담.
- 결과 통보** — 영상·내시경 소견은 당일~며칠 내 외래·문자로 통보. 받지 못하시면 ☎ 031-893-4560 전화.
- 다음 대장내시경 시점** — 정상 소견이면 보통 **5-10년 후**. 가족력·증상·위험 인자 있으면 더 짧을 수 있어 의사가 안내합니다.

회복 타임라인

- 당일 (Day 0)** — 진정 회복. 보호자 동반 귀가, 운전·중요 결정 X. 미음·죽 천천히 → 부드러운 식이.
- Day 1** — 일반 식이 복귀. 가벼운 가스·복부 팽만 자연 호전. 운동·사우나·여행도 컨디션 보고 정상 활동.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 소화기내과 전문

대장내시경 잘 받으셨습니다. 본 안내는 절제 없는 대장내시경 후 권고로, 환자별 상황에 따라 다를 수 있습니다. 응급 신호 시 즉시 연락 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-colonoscopy-clean/

