

# 운동은 벌칙이 아니라 대사 신호

약을 시작한 첫 주부터 가벼운 걷기를 붙이면 혈당·식욕·수면이 같이 안정됩니다. 목표는 완벽한 운동이 아니라 끊기지 않는 활동량입니다.

# 걷기는 감량보다 먼저 혈당을 안정시킵니다

식후 10분 걷기만 붙여도 혈당 패턴과 식욕 반응을 줄이는 데 도움이 됩니다.

처음부터 1시간 운동을 목표로 잡으면 오래 못 갑니다. 식후, 출퇴근, 계단, 집안일처럼 **하루에 나눠 넣는 10분**이 더 현실적입니다.

## START

### 첫 목표

식후 10분 걷기, 하루 1회부터 시작합니다.

## BUILD


### 누적 방식

10분 × 3회도 30분 운동입니다. 연속 시간이 아니어도 좋습니다.

## SIGNAL

### 대사 효과

근육이 포도당을 쓰면서 식후 혈당과 졸림이 줄어들 수 있습니다.



식후 10분 걷기

# 성인 기준은 주 150분, 시작은 절반부터

CDC 권고는 주 150분 중등도 유산소와 주 2일 근력운동입니다. 첫 달은 절반 목표로 충분합니다.



처음 2주는 150분을 채우기보다 **기록이 끊기지 않는 패턴**을 만드는 시기입니다. 진료 때 걸음수보다 실제 가능한 시간을 같이 조정합니다.

## WEEK 1

**70-90분**

하루 10-15분, 주 5-6일. 숨이 약간 차지만 대화 가능한 정도.

## WEEK 2

**90-120분**

컨디션이 괜찮으면 한 번에 20분까지 늘립니다.

## TARGET

**150분**

오심·어지럼 없이 유지되면 주 150분으로 천천히 접근합니다.

# 약 시작 초반에는 무리한 운동이 독이 될 수 있습니다

식사량이 줄고 수분이 부족하면 어지럼, 저혈당, 탈수가 생길 수 있습니다.

운동은 좋지만, 식사를 거의 못 하는 날의 고강도 운동은 위험할 수 있습니다. 몸이 보내는 신호를 보고 강도를 낮추는 것도 치료입니다.

## STOP

### 멈춰야 할 때

식은땀, 심한 어지럼, 가슴통증, 호흡곤란이 있으면 중단합니다.

## HYDRATE

### 수분 먼저

구토·설사·더운 날에는 운동보다 수분과 전해질 보충이 우선입니다.

## LOW GLUCOSE

### 당뇨약 병용

인슐린·설폰요소제 사용자는 운동 전후 저혈당 증상을 확인합니다.



수분·회복

# 운동복을 입기 전에도 운동은 시작됩니다

주차, 계단, 청소, 산책처럼 생활 안에서 활동량을 올리면 실패율이 낮습니다.



운동은 별도 일정이 아니라 생활 흐름에 붙일 때 오래 갑니다. **식후-양치-걷기**처럼 이미 있는 습관 뒤에 붙이세요.

## ANCHOR

### 습관 연결

식사 후 10분, 퇴근 후 한 정거장, 전화 통화 중 걷기.

## PAIN

### 관절 통증

무릎·허리가 불편하면 평지 걷기, 실내 자전거, 수중운동을 고려합니다.

## SLEEP

### 수면 보너스

낮 활동량이 늘면 밤 수면의 질이 좋아지고 야식 욕구도 줄 수 있습니다.

## 이번 회차는 10분부터 쌓기

이번 주는 오래 하는 운동보다, 식후와 일상 속에 자주 넣는 움직임이 목표입니다.

**01** 운동 시작은 식후 10분 걷기면 충분합니다.

**02** 처음부터 주 150분을 강박적으로 채우지 않아도 됩니다.

**03** 식사불가·탈수·어지럼이 있으면 운동 강도를 낮춥니다.

**04** 운동은 별도 이벤트가 아니라 생활에 붙이는 루틴입니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과  
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요