

알러지 비염 코 스프레이, 이렇게 사용하세요

Intranasal Spray Technique — 같은 약이라도 자세와 각도에 따라 효과가 달라집니다. 코 점막에 약이 잘 닿게 하는 4단계 자세, 그리고 효과를 유지하려면 매일 꾸준히 사용해야 하는 이유.

STEP 1 · 턱을 살짝 당기세요 — 들지 마세요 (Head Position)



왼쪽 X 약이 목으로 / 오른쪽 ✓ 약이 코 점막에

✕ 잘못된 자세 · 턱 들기

고개를 뒤로 젖히면 약이 코 점막을 지나치고 목으로 흘러내립니다. 쓴맛만 나고 효과는 거의 없습니다.

✓ 올바른 자세 · 턱 살짝 당기기

고개를 정면 또는 살짝 숙인 상태로 분사해야 약이 코 안쪽 점막에 정확히 닿습니다.


STEP 2~4 · 분사 각도 → 살짝 흡입 → 매일 꾸준히 (Technique & Routine)

STEP 2 · 같은 쪽 눈 방향으로



왼쪽 콧구멍 → 왼손 + 왼쪽 눈 방향, 오른쪽 콧구멍 → 오른손 + 오른쪽 눈 방향으로 비스듬히. 콧등 정중앙(비중격)을 향하면 코피가 납니다.

STEP 3 · 분사 후 살짝 흡입



뿌린 직후 입은 다물고 코로 부드럽게 들이마십니다. 너무 세게 빨면 약이 목으로 넘어갑니다. 분사 후 1~2분은 코를 풀지 마세요.

STEP 4 · 매일 같은 시간에



효과는 1~2주 누적 후 나타납니다. 그때그때 쓰는 약이 아니라 매일 1~2회 꾸준히 써야 효과가 유지됩니다. 좋아져도 임의 중단 금지.

뿌리기 전 준비 · 알아두세요 (Before & FAQ)

뿌리기 전에 · PREPARATION

코를 풀어 콧물·점액 먼저 빼냄. 식염수 세척 후 사용하면 약 흡수가 더 잘됩니다
새 약이거나 일주일 이상 안 쓴 약은 허공에 2~3번 분사(prime)해 안개가 나오는지 확인
분사구는 마른 휴지로 닦아 보관 — 물로 씻지 않습니다

알아두세요 · FAQ

효과는 1~2주 누적 후 발현 — 1~2회 쓰고 "효과 없다"며 중단 X
코피가 나면 각도를 다시 확인(눈 방향). 며칠 지속되면 진료
안전성 — 전신 흡수 1% 미만, 장기 사용 가능. 임신·수유 중 대부분 사용 가능 (의사 상담)

