

복부초음파에서 자주 나오는 소견

검진이나 진료 중 복부초음파에서 간·콩팥의 물혹, 담석, 담낭용종이 종종 발견됩니다. 대부분 크게 걱정할 소견은 아니지만, 언제는 지켜보고 언제는 추가로 확인하는지 정리했습니다.

간 물혹과 콩팥 물혹



소견	대부분은	더 확인하는 경우
간 물혹	간의 단순 물혹은 흔히 발견되며, 임상적으로 의미가 크지 않아 증상이 없으면 치료 없이 지켜봅니다.	벽이 두껍거나 모양이 애매하면 추가 영상검사를 상담합니다.
콩팥 물혹	단순 물혹은 위험도가 높지 않습니다.	물혹 안에 칸막이 가 있거나 벽이 두껍거나 , 조영제를 넣고 찍었을 때 진하게 보이는 부분 이 있으면 CT·MRI로 위험도를 나눕니다 (보즈니악 분류).

담석·담낭용종

소견	증상이 없을 때	이럴 때는
담석	증상이 없는 담낭 담석 은 대부분 바로 수술하지 않고 관찰합니다. 담석이 3cm를 넘으면 증상이 없어도 수술의 이득과 위험을 상담할 수 있습니다.	기름진 식사 뒤 오른쪽 갈비뼈 아래나 명치 가 쥐어짜듯 아프면 외과 진료를 상담하세요. 통증이 계속되면 예정된 진료를 기다리지 말고 빨리 진료받으세요. 열이나 황달이 함께 생기면 응급실로 가세요.
담낭용종	크기·모양에 따라 관찰하거나 수술을 상담합니다. 추적 중 저절로 없어지기도 합니다.	크기별 기준은 ' 담낭 폴립 추적 안내 '를 참고하세요.

초음파의 한계와 흔한 오해

흔한 오해 · 알아 두기	바로 알기
"담석이 있으면 무조건 수술해야 한다"	증상이 없으면 대부분 관찰합니다.
"초음파로 복통 원인을 다 알 수 있다"	복부초음파는 장 속 공기에 가려 췌장은 일부만 보일 수 있어, 필요하면 다른 검사를 함께 합니다.
알아 두기 — 검사 전 금식	검사 전 금식 하면 담낭이 잘 퍼져 더 정확하게 보입니다.

응급실로

오른쪽 윗배 통증이 계속되면서 **열이나 황달**이 함께 생길 때

빨리 진료가 필요한 경우

콩팥 물혹이 있는 분에서 **혈뇨, 발열, 새로 생긴 옆구리 통증**이 있을 때

담낭 폴립 추적 안내 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gallbladder-polyp-followup/
검사 전 준비 안내 edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/abdominal-ultrasound-prep/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한간담체외과학회 단순 간낭종 진료지침 2025 · 캐나다비뇨의학회 남성 신장 병변 지침 2023 · NICE 담석질환 지침(CG188)

2014 · 일본 담석질환 진료지침 2021 · 대한복부영상의학회 담낭용종 권고 2025(KJR)

본 자료는 일반 안내입니다. 실제 크기·모양·추적 간격은 검사 소견과 위험요인에 따라 담당 의뢰인과 상담해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/abdominal-us-common-findings/

