

# 채혈 후 지혈, 5분이 가장 중요합니다

짧게 누르고 떼시면 혈관 밖으로 피가 새어 멍·붓기가 생길 수 있습니다. 검사실을 나가시기 전에 아래 안내대로 충분히 압박해 주세요.

## 지혈 핵심 요약

압박 시간  
**5분**  
이상 꼭 누르기

금지  
**문지르기**  
팔 굽히기 X

운동·사우나  
**1일**  
지난 뒤

멍이 생겨도  
**1~2주**  
자연 소실

## 지혈이 부족하면 이렇게 멍이 듭니다



## 이렇게 압박해 주세요

1

### 숨 위를 손가락으로

채혈 부위에 댄 숨·거즈 위를 다른 손 손가락으로 꼭 누릅니다.  
문지르지 마세요.

2

### 팔은 펴고 5분

팔을 굽히지 않고 펴서 압박합니다. 굽히면 혈관이 다시 벌어집니다.

3

### 중간에 떼지 않기

잘 멎었는지 보려고 일찍 떼면 다시 출혈됩니다. **5분은 그대로.**

4

### 밴드 후 1시간

피가 멎으면 밴드를 붙이고, 1시간 동안 무거운 짐·운동은 피합니다.

## 멍이 생겼다면

### DO · 이렇게 해주세요

첫 1~2일은 냉찜질 — 부기와 멍 확산을 줄여줍니다  
그 후에는 따뜻한 찜질 — 흡수를 도와 멍이 빨리 빠집니다  
팔을 심장보다 위로 — 잠시 들어 올리면 부기 감소  
1~2주 내 자연 소실 — 색이 변하면서 점차 사라집니다

### DON'T · 피해주세요

멍을 문지르거나 주무르기 — 출혈이 더 번질 수 있음  
당일 사우나·수영·음주 — 혈관 확장으로 다시 출혈  
채혈 팔로 무거운 짐 — 1시간은 가볍게 사용  
밴드를 너무 일찍 떼기 — 최소 1~2시간은 유지



**30분 이상 출혈이 멎지 않거나, 손이 저리거나, 멍이 빠르게 커지면** 검사실을 나가지 마시고 바로 직원에게 알려주세요.

