


위내시경 검사 준비 안내문

위내시경의 정확도와 안전은 금식이 결정합니다. 위에 음식이 남아 있으면 위벽이 가려지고, 음식물이 기도로 넘어갈(흡인) 위험도 있습니다. 피를 묽게 하는 약·GLP-1 계열 주사를 쓰는 분은 임의로 끊지 말고 예약 때 의료진과 상의하세요.

📅 금식 시간표 — 가장 중요한 한 가지

언제	지킬 것
검사 12시간 전 (보통 전날 저녁 9시)	음식 완전 중단 — 일반식·우유·요구르트·유제품·과일·견과류·검·사탕 모두 금지. 저녁은 흰밥·죽·수프로 가볍게, 늦은 저녁·야식은 피합니다.
검사 8시간 전부터	우유·주스·커피·차·붉은·보라색 음료·탄산음료(사이다·콜라 포함) 금지. 맑은 물·보리차·투명한 이온음료만 소량.
검사 2시간 전 ~ 직전	맑은 물도 중단 · 흡연·검·사탕 금지, 침 삼키는 정도만. 혈압약 등 꼭 필요한 약은 검사 4시간 전까지 물 50mL 이하로.



💧 피를 묽게 하는 약(항혈전제) — 스스로 끊지 마세요

검사 종류	원칙 (아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·먹는 항응고제)
단순 관찰·조직검사	출혈 위험이 낮아 대부분 약을 끊지 않고 검사합니다.
용종 절제·치료 내시경	출혈 위험이 높아 약마다 쉬는 기간이 다르고 의료진이 정해 드립니다 — 클로피도그렐 5-7일, 와파린 5일 전(피 응고 수치 INR 확인), 먹는 항응고제(DOAC: 엘리퀴스·자렐토 등)는 마지막 복용 후 48시간 넘게.
모든 경우	심장·뇌졸중 위험과 출혈 위험을 함께 봐야 하므로 주치의와 상의한 뒤 결정 합니다. 예약 때 은행잎 등 영양제·한약까지 약 목록 전체를 가져오세요.

🍷 위고비·마운자로 등 GLP-1 계열 주사

위에서 음식이 내려가는 속도가 늦어져 **금식을 지켜도 음식이 남을 수 있습니다**. 예약 때 약 이름·용량·마지막 투약일을 알려 주시면 일정을 함께 정합니다.
자세히: '위고비·마운자로 사용 환자 검사 전 안내' edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/glp1ra-pre-procedure/

🕒 다른 약·도착

- **당뇨약·인슐린** — 예약 때 개별 지시 확인(스스로 중단 금지)
- **철분제·위 코팅제(개비스콘 등)** — 예약 때 중단 여부 확인(시아 방해)
- **30분 전 도착** · 신분증·약 목록 지참
- 수면내시경은 보호자 동반 · 24시간 운전·음주·중요한 결정·기계 조작 금지

📞 이럴 땐 바로 연락하세요 ☎ 031-893-4560

검사 전 — 감기·기침·발열·새 증상(검사 연기 여부 결정), 음식·물을 실수로 먹었을 때(먹은 시간 알려 주세요). 검사 후 — 검은변·혈변·심한 복통·구토, 38°C 이상 발열·가슴 통증·호흡곤란. **피를 토하거나 검은변·혈변이 많이 나오거나 심한 복통·가슴 통증·호흡곤란이 있으면 시간과 관계없이 응급실로(119).**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기내시경학회 · ASGE 2023 · 영국·유럽 소화기내시경학회 항혈전제 지침(BSG/ESGE 2021) · AGA/ASA 2024 (GLP-1 계열) · OCULUS 무작위 연구 2026

본 안내문은 일반 권고이며, 환자별 기저질환과 복용 약제에 따라 처방·일정이 달라질 수 있습니다. GLP-1 계열·항혈전제 사용 환자는 반드시 사전 상담 후 검사 일정을 확정합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/egd-prep/