


# 잠이 안 올 때 — 수면제보다 먼저 할 것

생활 습관 개선은 기본이며, 오래가는 불면증의 우선 치료는 불면증 인지행동치료입니다. 먼저 바꿀 습관을 정리했습니다.

## 🚶 낮 동안 만드는 밤의 잠 — 이 네 가지부터

|                                                     |                                                    |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>잠드는 시간보다<br/><b>기상 시각</b><br/>매일 같은 시각에 고정하기</p> | <p>일어나면<br/><b>햇빛 + 걷기</b><br/>아침 햇빛을 보고 낮에 걷기</p> | <p>카페인<br/><b>낮 12시</b><br/>까지만, 그 뒤로는 끊기</p> | <p>잠들기<br/><b>3시간 전</b><br/>부터 휴대폰·TV 멀리하기</p> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 🧠 그래도 잠이 안 온다면



| 🛌 누워도 잠이 안 올 때 · 15분 규칙                                                                                                                                                                                                                | 💊 멜라토닌 · MELATONIN                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15분</b> 넘게 잠이 오지 않으면 침대에서 나오세요</li> <li>• <b>노란 불</b> 아래서 <b>재미없는 책</b>을 보며 시간을 보내세요</li> <li>• 졸릴 때 다시 침대로 돌아가세요 — 침대는 잠자는 용도로만</li> <li>• 시계는 자주 보지 마세요. 계속 확인하면 오히려 더 깨게 됩니다</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 잠들기 <b>1~2시간 전</b>에 복용합니다</li> <li>• 수면제보다 <b>중독과 내성 위험이 적습니다</b></li> <li>• 복용 시점·용량은 처방받은 제품 설명을 따르세요</li> <li>• 모든 불면증에 같은 효과를 내지는 않습니다</li> </ul> |

## 🏠 수면제(졸피뎀 등)는 이렇게

항정신성의약품 · 원칙 세 가지

- 가끔, 짧게 — 필요한 기간만, 처방받은 용법 그대로 복용합니다
- **가족의 처방약도 나눠 먹지 마세요** — 법으로 금지돼 있고, 반응은 사람마다 다릅니다
- **깊은 잠을 보장하지는 않습니다** — 약마다 효과와 부작용이 달라 처방받은 대로만 드세요
- 오래 드셨다면 임의로 끊지 말고 **의사와 상의**해 줄이세요

## ❓ 흔한 오해 바로잡기

| 흔한 오해               | 의학적 사실 (바로 알기)                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| "누워 있으면 언젠가 잠든다"    | 깨어서 오래 누워 있으면 침대가 <b>뒤척이며 애쓰는 공간</b> 이 됩니다. 졸릴 때 눕는 것이 원칙입니다. |
| "가족 수면제를 잘라 먹어도 된다" | 항정신성의약품이라 <b>타인에게 건네는 것 자체가 불법</b> 이고, 부작용도 사람마다 다릅니다.        |
| "술 한잔 하면 잘 잔다"      | 잠드는 느낌은 들어도 <b>밤 후반에 자주 깡니다</b> . 수면제와 함께 마시는 것은 특히 위험합니다.    |

## ⚠ 이럴 땐 바로 진료를 · WARNING

수면제 복용 뒤 **기억나지 않는 행동**(무유·야간 식사·운전)이 있었다면 약을 더 드시지 말고 즉시 진료받으세요. **심하게 휘청이거나 넘어졌다면** 다음 복용 여부를 스스로 정하지 말고 의료진에게 바로 연락해 지시를 받으세요(오래 드신 약은 갑자기 끊는 것도 위험합니다). **심한 코골이·목격된 무호흡·낮졸림**이 있으면 단순 불면이 아닐 수 있습니다. 잠이 거의 없는데 **기분이 들뜨거나 충동적**으로 변했거나 **자해·자살 생각**이 든다면 즉시 의료진에게 알려 주세요. 실행할 생각이나 충동이 있거나 스스로 안전을 지키기 어렵다면 혼자 있지 말고 119에 연락하거나 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 불면증 임상진료지침 (2020) · European Insomnia Guideline (Journal of Sleep Research, 2023)

본 자료는 일반적인 안내이며, 오래된 불면증에는 인지행동치료 등 전문적인 치료가 도움이 될 수 있습니다. 복용법과 치료 계획은 담당 의사와 상의하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/insomnia-before-pills/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/insomnia-before-pills/)

