

변비약, 이렇게 쓰세요

생활습관을 먼저 챙기고, 자극성 하제는 필요할 때만, 삼투성 하제는 편하게 쓰세요. 변비약을 먹다 설사가 나면 변비약부터 쉬고, 콩팥이 약한 고령자는 관장·마그네슘 제제를 조심하세요.

먼저 생활습관부터 챙기세요

- 1 물을 충분히 마시기 — 평소 물을 적게 마셨다면 마시는 양부터 늘려보세요.
- 2 매일 걷는 등 몸을 움직이기 — 규칙적인 신체활동이 배변에 도움이 될 수 있습니다.
- 3 키위·푸룬·차전자피 챙기기 — 배변에 도움이 되는 대표적인 식이섬유 식품입니다. 자신에게 편한 것부터 시작하세요.

자극성 하제 vs 삼투성 하제 — 다르게 쓰세요

자극성 하제 · 돌코락스·메이킨 등

1. 장을 직접 자극해 배변을 유도하는 약입니다.
2. 자주 먹을수록 변비가 심해집니다(내성·의존). 매일 습관처럼 먹지 마세요.
3. 며칠씩 안 나올 때 필요할 때만 사용하고, 사용 계획은 진료실에서 확인하세요.

삼투성 하제 · 마그밀·락톨로스

1. 장 안에 수분을 머물게 해 배변을 돕는 약입니다.
2. 의존이 적어 필요할 때 편하게 쓸 수 있습니다.
3. 락톨로스는 가스·복부팽만이 흔하고, 마그밀은 콩팥 기능을 확인해야 합니다.

이런 상황엔 이렇게 하세요

변비약 먹다 설사가 나면

1. 설사약을 더하지 말고 변비약부터 쉬세요.
2. 추가 복용을 멈추고 상태를 지켜보세요.
3. 설사가 계속되거나 심하면 진료를 받으세요.

콩팥이 약한 고령자는

1. 관장, 특히 인산염 관장을 조심하세요.
2. 마그네슘 제제(마그밀 등)도 주의가 필요합니다.
3. 콩팥 기능이 걱정되면 진료 시 미리 말씀해 주세요.

흔한 오해 바로잡기 & 바로 진료가 필요한 경우

MYTH → FACT

“센 변비약이 좋은 약” → 빠르게 듣는 약이 모두에게 맞는 것은 아닙니다. 내 상태에 맞는 약을 고르는 것이 우선입니다.
“약 먹을 때만 나오니 계속 먹어야 한다” → 약이 필요할 만큼 변비가 지속되고 있다는 뜻일 수 있습니다. 생활습관을 함께 조절하며 약을 다시 평가하세요.

▲ 바로 진료가 필요한 경우

다음 중 하나라도 있으면 바로 진료를 받으세요 — 소량의 혈변, 원인 모를 체중 감소나 빈혈, 배·항문에서 만져지는 덩이, 마그네슘 제제 복용 중 무기력·졸림·어지럼. ☎ 031-893-4560 피가 많이 나오거나 검고 끈적한 변(타르변), 심한 복통·구토와 가스·변이 전혀 안 나온, 맥박이 느려지거나 의식이 흐려지면 응급실로 가세요.

