

간수치 상승·지방간 결과 안내

간수치(AST/ALT/GGT) 상승은 흔하지만 원인은 다양합니다. 지방간은 최근 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로도 불리며, 간 자체보다 심혈관질환·간 외 암 위험이 더 문제가 되는 경우가 많습니다. 음주, 약·영양제, 바이러스감염, 근육 손상 등도 함께 확인하고 위험도에 따라 재검과 추가 검사를 정합니다.



검사 결과에서 보는 핵심

ALT 간세포 간에 특이적인 염증 지표	AST 간·근육 운동 후도 상승 가능	GGT 음주·비만 단독 상승은 주로 음주·비만	감량 목표 5~10 % 체중
---	--	---	------------------------------

흔한 원인과 확인할 검사

흔한 원인

지방간 — 복부비만·당뇨·고중성지방과 동반
음주 — GGT(r-GTP) 단독 상승은 주로 음주·비만이 원인, AST가 ALT보다 높을 수 있음
약·영양제 — 진통제, 한약, 보충제 포함
운동·근육 손상 — AST/CK 동반 상승 가능

추가 확인

간염 검사 — B형·C형 간염 여부
복부초음파 — ALT만 높다고 지방간은 아닙니다 — 지방간은 초음파 같은 영상으로 확인합니다(담석·간 종괴 확인)
대사 위험 평가 — 혈당, 지질, 혈압, 허리둘레
섬유화 평가 — FIB-4, 필요 시 탄성도 검사
약물(우루사 등) — 간수치는 내려도 지방간 자체는 그대로일 수 있음

생활 관리의 우선순위

먼저 줄일 것

술 — 지방간에겐 적정 음주량이 없음, 재검 전 2~4주 금주 권장
당 음료·과자 — 과당은 지방간 악화와 연관
제로 음료·과일주스 — 당 음료와 함께 금지
야식·폭식 — 체중보다 복부지방 감소가 중요
불필요한 보충제 — 성분 불명 제품은 중단 상담

늘릴 것

주 150분 유산소 — 빠르게 걷기부터 시작
주 2회 근력운동 — 인슐린 저항성 개선
단백질·채소 중심 식사 — 흰쌀·면·빵 양 줄이기
3개월 재평가 — 간수치·체중·허리둘레 비교

빨리 진료가 필요한 신호

황달, 콜라색 소변, 심한 우상복부 통증, 발열, 명·코피 증가, 복부 팽만, 원인 모를 체중 감소가 있으면 단순 지방간으로 넘기지 말고 빨리 진료를 보세요. 심한 우상복부 통증에 발열 또는 황달이 함께 있으면 응급실로 가세요. 간수치가 정상이어도 지방간·섬유화가 있을 수 있어 위험요인에 따라 추적이 필요합니다.

