

편두통 — 위장 증상에 가려진 진짜 원인

메스꺼움·소화불량과 함께 오는 두통은 단순히 "체한 것"이 아닐 수 있습니다. 편두통 환자의 60~90%가 메스꺼움·구토 같은 위장 증상을 함께 겪습니다. 집에서는 두통일기와 규칙적인 생활이 치료의 기본입니다.

🍴 위장 증상으로 먼저 오는 편두통

두통 하루이틀 전의 메스꺼움·식욕 변화, 발작 중 위가 느껴져 **먹은 약이 잘 안 듣는 것**, 두통 없이 반복되는 복통·구토도 편두통의 한 모습일 수 있습니다. 내시경·복부 검사가 정상인데 이런 증상이 발작처럼 되풀이되면 진료 때 말씀해 주세요. 편두통은 4~72시간 이어지는 두통이 ①한쪽 ②육신거림 ③중간 이상 세기 ④움직이면 심해짐 중 두 가지 이상이고, 메스꺼움·구토나 빛·소리 과민이 함께 오는 발작이 5번 이상 되풀이될 때 진단합니다.

📖 두통일기 — 적어서 다음 진료 때 가져오세요



적을 것	예시
날짜·시간	시작한 때와 끝난 때
강도	0(없음)~10(가장 심함) 중 몇 점인지
유발 요인	잠 부족·늦잠, 끼니 거름, 생리, 스트레스, 술·음식, 날씨
먹은 약	약 이름·먹은 시각·효과가 있었는지
함께 온 증상	메스꺼움·구토, 빛·소리가 거슬림, 체한 느낌

👉 오늘부터 실천할 7가지

🏠 생활 습관	💊 약 먹는 법 · 운동
① 두통일기 쓰기 — 날짜·강도·유발 요인·먹은 약	⑥ 발작이 시작되면 처방받은 약을 바로 — 참다 먹으면 효과가 떨어집니다
② 매일 같은 시각에 자고 일어나기 (주말 포함)	⑦ 진통제는 한 달에 10일 이하 — 약물 과용 두통 예방
③ 끼니 거르지 않기 · 물 충분히 마시기	⑧ 걷기 같은 유산소 운동을 꾸준히 · 명상·요가
④ 카페인 일정하게 — 갑자기 늘리거나 끊지 않기	메스꺼움이 심하면 구토를 줄이는 약(진토제)을 함께 처방받을 수 있습니다

두통약을 한 달에 10일 넘게 먹으면 두통이 더 잦아지는 '약물 과용 두통'이 올 수 있습니다. 발작이 한 달 4번 이상이거나 일상이 힘들면 예방약을 상담하세요.

🚑 이런 두통은 즉시 응급실 또는 정밀검사

- **벼락 두통** — 몇 초 만에 극심해짐 · **50세 이후 처음** 시작된 두통 · **열·목 뻣뻣함**이 함께 올
- **한쪽 마비·말이 어눌함·시야가 가려짐** · 며칠~몇 주에 걸쳐 **점점 심해짐** · 기침·재채기에 심해짐

함께 보기 — 진료실에서 보신 설명 자료 「편두통 — 위장 증상에 가려진 진짜 원인」 edu.gwanggyobarun.com/decks/neurology/migraine/diagnosis/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국제두통분류 3판(ICHD-3, 2018) · 대한두통학회 진료지침 (2021) · AHS Consensus Statement 2021

본 자료는 일반 환자교육용입니다. 두통 양상이 변하거나 위험 신호가 나타나면 즉시 내원해 주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/migraine/