

일어설 때 핑 도는 분께

저혈압·기립성 어지럼 관리 — 혈압약을 드시지 않으면서 일어설 때 어지러운 분을 위한 안내입니다. 고혈압 환자용 저염식 안내문과는 반대 방향이니, 혈압약을 드시는 분은 이 내용을 따르지 마세요.

📌 생활에서 이렇게 관리하세요 — 매일 실천 4가지



실천	방법
물·소금	물은 하루 2L 이상(2~3L) 마시고, (고혈압이 아니라면) 너무 싱겁게 먹지 않습니다. 심부전·신장질환 등으로 물이나 소금을 제한 중이시라면 이 조언 대신 먼저 상담하세요.
종아리 운동	종아리는 제2의 심장입니다 — 까치발을 들었다가 천천히 내리는 동작 을 매일 반복해 주세요.
압박스타킹	압박스타킹도 도움이 됩니다.
자세·환경	자세는 천천히 바꾸고, 사우나나 오래 서 있는 것은 피합니다.

❓ 헷갈리기 쉬운 것들

이렇게 생각하기 쉽지만	바로 알기
"저염식은 누구에게나 좋다"	저염식이 누구에게나 좋은 것은 아닙니다 — 기립성 저혈압에서는 상태에 따라 염분 섭취를 조절합니다.
"물만 마시면 된다"	물만 마시고 식사를 거르지 않습니다 — 조금씩 자주 드세요.
"이온음료가 더 좋다"	이온음료보다 물이 우선입니다 — 제품에 따라 당분(액상과당)이 들어 있습니다.
"어지러우면 다 혈압 탓"	빙빙 도는(회전성) 어지럼은 혈압보다 귀 문제인 경우가 많습니다 — 양상을 진료 때 알려주세요. 차이는 「어지럼, 빙빙 도는 것과 핑 도는 것은 다릅니다」 안내문에 있습니다.
"혈압 올리는 약을 먹으면 된다"	승압제(혈압을 올리는 약)는 부작용이 많아 특별한 경우가 아니면 잘 사용하지 않습니다 — 생활습관 관리를 먼저 시도합니다.

⚠ 핑 돌 때 대처 · 진료가 필요한 경우

핑 돌면 넘어지지 않도록 그 자리에서 **바로 안전하게 앉거나 누우세요**. 쪼그려 앉기는 안전하게 할 수 있을 때만 하세요. 아래에 해당하면 생활습관 관리만으로 넘기지 말고 진료를 받아 주세요.

- 누워 있거나 앉아 있을 때, 운동 중에, 전조 없이 쓰러진 실신은 **응급실에서 평가가 필요합니다**
- 생활습관 관리로 나아지지 않거나 자주 쓰러진다면 추가 평가·치료가 필요할 수 있습니다

함께 보기 — 빙빙 도는 어지럼: 「어지럼, 빙빙 도는 것과 핑 도는 것은 다릅니다」 edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/dizziness-vs-vertigo/
쓰러진 적이 있다면: 실신 설명 자료 「미주신경성 실신」 edu.gwanggyobarun.com/decks/cardio/vasovagal-syncope/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 2022 고혈압 진료지침 · 2018 ESC 실신(Syncope) 가이드라인 · Autonomic Neuroscience 2020(비약물 기립성 저혈압 관리)

본 자료는 혈압약을 복용하지 않는 분의 저혈압·기립성 어지럼 관리를 위한 일반 안내입니다. 어지럼의 원인과 개인별 관리 방법은 담당 의사와 상담해 정하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/orthostatic-dizziness-low-bp/

