


갑상선 기능검사 결과 안내

갑상선 검사는 TSH와 Free T4를 중심으로 해석합니다. 수치가 조금 벗어나도 일시 변화, 약·영양제, 임신, 갑상선염 등에 따라 달라질 수 있어 증상과 재검을 함께 봅니다.



갑상선 수치는 호르몬 속도, 증상 변화, 추적 검사 일정으로 이어집니다.

주요 항목 이해하기

TSH
조절

뇌하수체 신호

FREE T4
호르몬
활성 전 단계

T3
항진
평가에 도움

항체
원인
자가면역 확인

대표적인 결과 패턴

기능저하 쪽 패턴

TSH 높고 Free T4 낮음 — 갑상선기능저하증 가능
TSH만 약간 높음 — 무증상 갑상선기능저하, 재검 필요
피로·추위·변비·부종 — 증상과 함께 해석
TPO 항체 양성 — 하시모토 갑상선염 가능

기능항진 쪽 패턴

TSH 낮고 Free T4/T3 높음 — 갑상선기능항진증 가능
TSH만 낮음 — 초기 항진, 약물 영향, 일시 변화 확인
두근거림·체중감소·손떨림 — 빠른 평가 필요
TRAb 양성 — 그레이브스병 가능

검사 전후 주의할 점

결과를 흔들 수 있음

비오틴 — 고용량 복용 시 TSH/T4 결과 간섭 가능
임신·출산 후 — 정상 범위와 해석이 달라질 수 있음
감기·중증 질환 후 — 일시적 변화 가능
갑상선약 복용 시간 — 채혈 전 복용 여부를 알려주세요

다음 단계

재검 — 경미한 이상은 보통 6~12주 후 확인
항체 검사 — 원인 감별에 도움
초음파 — 결절·갑상선염 의심 시 시행
약물 조정 — 임의 시작·중단 없이 진료 후 결정

빨리 진료가 필요한 신호

안정 시 심한 두근거림, 흉통, 숨참, 고열, 심한 손떨림, 갑작스러운 체중 감소가 있으면 갑상선기능항진 평가가 필요합니다. 심한 무기력, 저체온감, 부종, 서맥이 뚜렷한 경우도 진료를 미루지 마세요.

